九十八年三月主要作物病蟲害預測

陳任芳

作物別	病蟲害種類	時期	防　治　要　點　（防治藥劑請參考植保手冊）
水稻	負泥蟲	全月	1. 水稻生育初期，幼蟲發生時，施用3%加保扶粒劑，配合追肥混合後撒施。 2. 利用噴佈方式時可選用50%益滅松等推薦藥劑施用。 3．施藥時慎防污染水源以免產生魚毒。
	葉稻熱病	中下旬	1. 適度氮、磷、鉀三要素配合施用，氮素肥料勿過量施用。 2. 插秧後25　30天左右，施用三賽唑可濕性粉劑或撲殺熱粒劑預防。 3. 病斑出現時，施用熱必斯、護粒松、亞賜圃等藥劑防治。
	螟蟲 （一點螟、二化螟）	下旬	稻株葉鞘變黃或田間有流葉、折葉、枯心時，即選擇撲滅松乳劑等藥劑施用
	福壽螺	全月	1. 隨時撿拾螺體、摘除銷毀卵塊。 2. 灌溉圳渠進、出水口設置阻隔網（內層粗網6　10目，外層細網16　32目）。 3. 插秧前、後噴撒耐克螺、聚乙醛、苦茶渣等藥劑，但應注意魚毒。
	水象鼻蟲	全月	1. 改善耕作環境、清除雜草，整平田面避免積水。 2. 插秧前期秧苗以丁基加保扶、加保扶粒劑處理。 3．本田期施用培丹、加保扶、丁基加保扶粒劑，應注意魚毒。
玉米	煤紋病	中下旬	1. 肥料三要素平衡使用。 2. 發病初期施用錳乃浦可濕性粉劑防治。
	玉米螟	中下旬	1. 肥料三要素平衡使用。 2. 發病初期施用錳乃浦可濕性粉劑防治。
雜糧、蔬菜	斜紋夜盜蟲	全月	1. 播種整地時撒佈加保扶粒劑等防除。 2. 幼株時採用陶斯寧、陶斯松、畢芬寧乳劑等藥劑防除。 3. 栽種田區懸掛性費洛蒙緩釋劑。
番茄	晚疫病	全月	1. 以遮雨設施防降雨。 2. 注意氣象預報，低溫連續雨天後或停雨時，即噴施藥劑。 3. 藥劑選用氫氧化銅、亞托敏、賽座滅、達滅芬、凡殺克絕或亞磷酸施用。 4. 參考使用亞磷酸加氫氧化鉀1000倍，病害發生前使用。
芋	疫病	下旬	1. 注意氣象預報，連續雨天或停雨時，即噴施藥劑。 2. 選用三元硫酸銅等藥劑噴施。
韭菜、青蔥	銹病	全月	韭菜選用三得芬乳劑、百克敏乳劑或菲克利，青蔥選用三泰隆、三氟敏等藥劑噴施。
青蔥	紫斑病	全月	選用亞托敏、克收欣、甲鋅保粒素或依普同等藥劑噴施。
	甜菜夜蛾	全月	1. 選用因滅汀、因得克、蘇力菌等防治之。 2. 栽種田區懸掛性費洛蒙緩釋劑。
蔬菜、瓜果	銀葉粉蝨	全月	每一葉片逾5隻選用畢芬寧、阿巴汀、益達胺、布芬淨、培丹藥劑，並配合黃色粘紙防治。
十字花科蔬菜、果樹、柑桔、梨	小菜蛾	全月	選用蘇力菌、脫芬瑞、因得克或因滅汀等藥劑噴施。
	黃條葉蚤	全月	1. 種植前全園浸水30　45天。 2. 發現有該蟲初期發生時可選用培丹或阿巴汀等藥劑噴施。
	蚜蟲類	全月	1. 清除園區外圍及附近雜草。 2. 選用畢芬寧、益達胺、派滅淨等藥劑噴施。 3. 距作物高度不超過1公尺懸掛黃色粘紙，5公尺置一塊。
	果實蠅	全月	請加強該蟲之誘殺盒懸掛，以徹底防治果實蠅，全面降低該蟲密度，減免果實被害。
	潛葉蛾	下旬	選用芬諾克、陶斯松、佈飛賽滅寧等藥劑防治之。
	黑星病	下旬	發病初期用四克利、易胺座或三氟敏等藥劑防治。