農藥使用方法與範圍　新增番荔枝姬黃薊馬之農藥4種

農藥名稱	使用方法		施藥時期及方法	注意事項	備註
	每公頃每次施藥量（公升）	稀釋倍數			
畢芬寧 2.8％乳劑	0.75~1.0	1000	害蟲於幼嫩心葉發生時，每隔7天施藥一次，連續3~4次。施藥時應噴及右嫩心葉。	採收前6天停止施藥。	(1)具中度眼及皮膚刺激性。(2)具水生物劇毒性。(3)魚毒警告標誌。(4)對蜜蜂毒高。(5)勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
賽洛寧 2.8％乳劑	0.35~0.5	2000			(1)具呼吸中等毒性。(2)具中度眼刺激性及皮膚過敏性。(3)對蜜蜂具毒性。(4)對水生物劇毒性。(5)魚毒警告標誌。(6)勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
益達胺 9.6％溶液	0.5~0.75	1500		採收前9天停止施藥。	(1)具水生物中等毒性。(2)魚毒警告標誌。(3)對蜜蜂毒性高。
硫敵克34％水懸劑	0.5~0.75	1500		採收前12天停止施藥。	(1)魚毒警告標誌。(2)勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。

(94.02.15農委會動植物防疫檢疫局字第0941484131號)