

**公告核准登記及新增農藥使用方法與範圍**

農藥名稱	使用方法		使用範圍	登記廠商名稱	施藥時期及方法	注意事項
	每公頃每次用藥量	稀釋倍數				
陶斯寧 50% 混合乳劑	1 公升	1000	紅豆莢 莢螟	拜耳作物科學股份有限公司	幼蟲發生時期開始施藥，每隔 7 天施藥一次	採收前 6 天停止施藥
納乃得 40% 可溶性粉劑	0.6 0.8 公升	1500	甘藍芽 蟲類	台灣杜邦股份有限公司	蟲害發生時間開始施藥，每隔 7 天施藥一次	採收前 6 天停止施藥
貝他賽扶寧 2.9% 乳劑	1.0 1.2 公升	1500	檬果葉 蟬	拜耳作物科學股份有限公司	抽穗及開花蟲害發生時，每隔 10 天施藥一次	採收前 6 天停止施藥
合芬寧 5% 膠囊懸著劑	1.2 1.6 公升	500	木瓜葉 璫	惠光化學股份有限公司	葉璫發生時施藥一次	採收前 6 天停止施藥
賽座滅 9.4% 水懸劑	0.3 0.5 公升	3000	胡瓜露 菌病	台灣石原產業股份有限公司	發病初期開始施藥，每隔 7 天施藥一次，連續 4 次	採收前 3 天停止施藥
			葡萄露 菌病			採收前 6 天停止施藥
克熱淨(烷苯磺酸鹽)40% 可濕性粉劑	0.1 1 公 斤	1500	洋香瓜 白粉病	台灣三荳化學工業股份有限公司	發病初期開始施藥，每隔 7 天施藥一次，連續 3 次	採收前 6 天停止施藥
凡殺克絕 52.5% 混合水分散性粒劑	-	2500	馬鈴薯 晚疫病	台灣杜邦股份有限公司	發病初期開始施藥，每隔 7 天施藥一次，連續 4 次	採收前 6 天停止施藥
			葡萄露 菌病			採收前 9 天停止施藥
		1500	蓮霧疫 病		發病初期開始施藥，每隔 7 天施藥一次，直至套袋為止	採收前 12 天停止施藥
滅普寧 75 % 可濕性粉劑	-	1500(澆 灌)	菠菜苗 粒枯病	瑞總有限公司	播種後立即澆灌 1500 倍稀釋液 1 次，每平方公尺均勻噴灑稀釋液 2 公升	限苗床使用

( 92.12.03 農業委員會農糧字第 0920021957 號函 )