

# 花蓮宜蘭局部地區已出現稻熱病 請農友注意加強防治

花蓮、宜蘭地區一期作水稻生育期，已陸續進入最高分蘗期。由於最近氣候乍晴乍雨，日夜溫差大，此種氣候條件下葉稻熱病極易發生及蔓延，且易造成嚴重損害。同時今年一期作秧苗因遇低溫寒害，植株生長勢弱，抗病性可能降低，而增加感染機會。因此，本場呼籲農友應注意田間病害監測，並採取適當防治措施。

防治藥劑農友可以參考選用下列藥劑防治：(1)2.5%富米熱斯可濕性粉劑1,000倍，每公頃每次用1.0公斤。(2)50%熱必斯可濕性粉劑1,200倍，每公頃每次用1.0公斤。(3)75%三賽唑可濕性粉劑3,000倍，每公頃每次用0.33公

斤。(4)20%嘉賜三塞唑可濕性粉劑1,500倍，每公頃每次用0.7公斤。(5)35%護粒丹可濕性粉劑1,000倍，每公頃每次用1.0~1.2公斤。(6)40%亞賜圍可濕性粉劑1,000倍，每公頃每次用0.7~1.0公斤。(7)21.4%保米賜圍乳劑1,000倍，每公頃每次用1.0~1.2公升。(8)15%加普胺水懸劑2,000倍，每公頃每次用0.5~0.6公升。(9)6%撲殺熱粒劑，每公頃每次用30公斤。進行防治時，應依照植物保護手冊，遵守藥劑使用相關規定及注意事項，並隨時注意本場發佈之警報。亦可透過「作物病蟲害診斷服務站」服務專線：0800-095590，聯繫洽詢。