

作物別	病蟲害種類	時 期	防 治 要 點
水 稻	福 壽 螺	中 下 旬	1.隨時撿拾螺體、摘除卵塊。2.灌溉圳渠進、出水口設置阻隔網。3.噴撒耐克螺、聚乙醛、苦茶渣等藥劑，但應注意魚毒。
	黑尾浮塵子	全 月	1.水稻收割後，應即翻犁稻田，深埋殘株。2.清除田邊雜草，防範媒介昆蟲潛伏。3.採用加保扶粒劑等於秧苗期或本田初期施用。
	螟 蟲	中 下 旬	1.水稻收割後儘速翻犁，深埋殘株，減少寄主場所。2.育苗期選用3%加保扶粒劑等施撒。3.成蟲出現後5-7天選用50%撲滅松乳劑等防治。
落花生 玉 米	夜蛾類害蟲	中 下 旬	1.採用性費洛蒙誘殺雄性成蟲。2.播種整地時，施撒3%加保扶粒劑或10%福瑞松粒劑等。3.發芽後參考採用2.8%賽洛寧乳劑噴施根際部，田園四周同時施藥。
芋	斜紋夜蛾	全 月	1.採用性費洛蒙緩釋劑誘殺雄性成蟲。2.初齡幼蟲出現時，於傍晚噴施畢芬寧或陶斯松等藥劑。3.田埂、溝壁亦應同時施藥。
	疫 病	全 月	1.注意氣象預報，連續雨天或停雨時，即噴施藥劑。2.噴施鋅錳滅達樂、福賽得等藥劑。
蔬菜/瓜果	銀葉粉蝨	全 月	1.清除園區附近雜草，林木等減少棲息場所。2.參考選用畢芬寧、阿巴汀、益達胺等藥劑噴施，並配合懸掛黃色粘板施藥。
果 樹 類	東方果實蠅	全 月	1.全面懸掛誘殺板或食物誘引劑。2.撿拾廢棄及落果，避免滋生果實蠅。3.酌量施用藥劑。
蓮 花	小黃薊馬	全 月	1.清除田區附近雜草，避免或減少棲息場所。2.每葉片逾10隻時選用益達胺、芬普尼、亞滅培等藥劑防治。