九十七年六月主要作物病蟲害預測

陳任芳

作物別	病蟲害種類	時　期	防　治　要　點
水　稻	葉稻熱病	全月	1.適度氮、磷、鉀三要素配合施用，氮素肥料勿過量施用。 2.插秧後25-30天左右，施用三賽唑可濕性粉劑或撲殺熱粒劑預防。3.病斑出現時，施用熱必斯、護粒松、亞賜圃等藥劑防治。
	穗稻熱病	中、下旬	1.適度施用穗肥。2.抽穗前5-7天施用三賽唑、熱必斯、護粒松等藥劑預防，齊穗再施藥一次。
	白葉枯病	全月	1.避免偏施氮肥。2.晨露未乾前，避免進入稻田，減少人爲傳染。3.常發病田應於幼穗形成期前施6%撲殺熱粒劑預防。4.病斑初現時以10%克枯爛可濕性粉劑或10%鏈四環黴素可濕性粉劑噴施。
	紋 枯 病	全月	選用賓克隆、待克利、滅紋、鐵甲砷酸銨、貝芬同、維利黴素等藥劑防治。
	螟蟲(一點螟、二化螟)	全月	1.注意初期防除。2.稻株葉鞘變黃或田間有流葉、折葉、枯心時，即選用撲滅松乳劑等施用，尤須注意孕穗、抽穗前期之施藥防治。
玉　米	煤紋病	全月	1.力求肥料三要素平衡使用。 2.發病初期施用鋅錳乃浦可濕性粉劑等藥劑防治。
	玉米螟	全月	採用釋放寄生蜂，飼料玉米以加保扶粒劑等藥劑施用，食用玉米採用蘇力菌或諾伐隆噴施。
落花生	葉斑病	全月	病斑出現時即行選用鋅錳乃浦可濕性粉劑等藥劑防治，每10天噴施一次。
落花生 蓮　花	小黃薊馬	全月	生育初期用達馬松溶液防除，每10-14天噴施一次，共2次。 蓮花田可以亞滅培、益達胺等藥劑噴施。
雜　糧 蔬　菜	斜紋夜盜	全月	1.針對栽培作物種類，依據植保手冊選擇推薦用藥。2.播種整地時撒佈加保扶粒劑等防除。3.幼株時採用陶斯寧、陶斯松、畢芬寧乳劑等藥劑防除。4.栽種田區懸掛性費洛蒙緩釋劑。
	銀葉粉蝨	全月	1.採用32目防蟲網隔絕成蟲。2.利用畢芬寧、益達胺、阿巴汀等藥劑防治（應視作物種類，參考植保手冊用藥）。3.清除雜草。
芋	疫病	全月	1. 注意氣象預報，連續雨天或停雨時，即噴施藥劑。2. 選用三元硫酸銅等藥劑噴施。
韭　菜 青　蔥	銹病	上、中旬	選用三得芬乳劑、百克敏乳劑或菲克利、三泰隆(青蔥)等藥劑噴施。
青　蔥	紫斑病	全月	選用亞托敏、克收欣、甲鋅保粒素或依普同等藥劑噴施。
	甜菜夜蛾	全月	1.選用因滅汀、因得克、蘇力菌等防治之。2.栽種田區懸掛性費洛蒙緩釋劑。