春暖花開季節　請注意青蔥銹病防治



▲銹病在青蔥上之病徵。

氣溫漸暖，蘭陽地區濕度仍高，農友俗稱「紅菇」的青蔥銹病即將進入好發季節，　銹病是早春時期容易發生的一種病害，銹病菌感染青蔥後，葉片上產生許多銹黃色小斑，因顏色近鐵鏽色故名銹病，而不只有青蔥會發生銹病，其他如韭菜、玉米、茭白筍、葡萄等均會發生此種病害，此病害易藉風、雨傳播而感染蔓延。主要危害葉片及花梗，表皮稍有突起後破裂，露出橘紅色粉狀物，是爲夏孢子堆，而病斑上所產生的夏孢子隨風、雨水傳播，造成重複感染，是流行的主因。蔥銹病菌較適低溫，於22℃以上夏孢子即較不適宜發芽，34℃以上則完全不發芽，因而多在早春至4～5月間危害，當氣溫轉高，雨水豐沛時即不見；地力較差處更易發生猖獗危害。

青蔥是宜蘭縣重要經濟蔬菜產業之一，全縣青蔥栽培達700公頃，其產值達5億以上，爲宜蘭青蔥主要收入之一。本場建議栽培青蔥的農友把握防治適期，儘速依照植物保護手冊之推薦，於病害發生初期即施藥防治，以避免遭受損失。

防治藥劑：

1、50％三氟敏水分散性粒劑4,000倍，發病初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續四次。採收前12天停止施藥。

2、23％三泰隆乳劑2,000倍，發病初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續四次。採收前15天停止施藥。

