九十七年五月主要作物病蟲害預測

陳任芳

作物別	病蟲害種類	時　期	防　治　要　點
水稻	葉稻熱病	全 月	1.適度氮、磷、鉀三要素配合施用，氮素肥料勿過量施用。 2.插秧後25～30天左右，施用三賽唑可濕性粉劑或撲殺熱粒劑預防。3.病斑出現時，施用熱必斯、護粒松、亞賜圃等藥劑防治。
	穗稻熱病	中、下旬	1.適度施用穗肥。2.抽穗前5～7天施用三賽唑、熱必斯、護粒松等藥劑預防，齊穗再施藥一次。
	白葉枯病	全月	1.避免偏施氮肥。2.晨露未乾前，避免進入稻田，減少人爲傳染。3.常發病田應於幼穗形成期前施6%撲殺熱粒劑預防。4.病斑初現時以10%克枯爛可濕性粉劑或10%鏈四環黴素可濕性粉劑噴施。
	紋 枯 病	全月	選用賓克隆、待克利、滅紋、鐵甲砷酸銨、貝芬同、維利黴素等藥劑防治。
	螟蟲(一點螟、二化螟)	全月	1.注意初期防除。2.稻株葉鞘變黃或田間有流葉、折葉、枯心時，即選用撲滅松乳劑等施用，尤須注意孕穗、抽穗前期之施藥防治。
玉米	煤紋病	全月	1.力求肥料三要素平衡使用。 2.發病初期施用鋅錳乃浦可濕性粉劑等藥劑防治。
	玉米螟	全月	採用釋放寄生蜂，飼料玉米以加保扶粒劑等藥劑施用，食用玉米採用蘇力菌或諾伐隆噴施。
落花生	葉斑病	全月	病斑出現時即行選用鋅錳乃浦可濕性粉劑等藥劑防治，每10天噴施一次。
落花生 蓮花	小黃薊馬	全月	生育初期用達馬松溶液防除，每10～14天噴施一次，共2次。 蓮花田以亞滅培、益達胺等藥劑噴施。
雜糧 蔬菜	斜紋夜盜	全月	1.針對栽培作物種類，依據植保手冊選擇推薦用藥。2.播種整地時撒佈加保扶粒劑等防除。 3.幼株時採用陶斯寧、陶斯松、畢芬寧乳劑等藥劑防除。4.栽種田區懸掛性費洛蒙緩釋劑。
	銀葉粉蝨	全月	1.採用32目防蟲網隔絕成蟲。 2.利用畢芬寧、益達胺、阿巴汀等藥劑防治（應視作物種類，參考植保手冊用藥）。3.清除雜草。
芋	疫病	全月	1.注意氣象預報，連續雨天或停雨時，即噴施藥劑。2.選用三元硫酸銅等藥劑噴施。
韭菜 青蔥	銹病	上、中旬	選用三得芬乳劑、百克敏乳劑或菲克利、三泰隆(青蔥)等藥劑噴施。
蔥	紫斑病	全月	選用亞托敏、克收欣、甲鋅保粒素或依普同等藥劑噴施。
	甜菜夜蛾	全月	1.選用因滅汀、因得克、蘇力菌等防治之。2.栽種田區懸掛性費洛蒙緩釋劑。
蔬菜瓜果	銀葉粉蝨	全月	每一葉片逾5隻選用畢芬寧、阿巴汀、益達胺、布芬淨、培丹藥劑，並配合黃色粘紙使用防治。
十字花科蔬菜	小菜蛾	上、中旬	選用蘇力菌、脫芬瑞、因得克或因滅汀等藥劑噴施。
	黃條葉蚤	全月	發現有該蟲初期發生時可選用培丹或阿巴汀等藥劑噴施。
	蚜蟲類	上、中旬	1.清除園區附近雜草。2.選用畢芬寧、益達胺、派滅淨等藥劑噴施。
柑桔類 文旦	黑星病	全月	1.提前預防避免爲害果實造成病班。 2.可選用免賴得、晴硫醌、甲基多保淨等藥劑噴施。
	黑點病	全月	1.提前預防避免爲害果實造成病班。 2.可選用免賴得、晴硫醌、甲基多保淨等藥劑噴施，梅雨季可視田間實際狀況酌增施藥次數。
	銹蜱	全月	幼果、小果期爲防治適期，可施用可濕性硫磺、克芬蟎、芬普蟎等藥劑。
	星天牛	全月	樹幹部分塗佈石灰乳或包覆塑膠布或施用40.6%加保扶水懸劑避免天牛成蟲產卵於樹幹。
果樹類	果實蠅	全月	請加強該蟲之誘殺盒懸掛，以徹底防治果實蠅，全面降低該蟲密度，減免果實被害。