農業諮詢農友信箱

陳朝欽 1995 花蓮區農業專訊 14:24

一、楓香樹葉背有粉狀物，葉片枯黃凋落，不知受害原因?(陳如坤：吉安鄉稻香村 11 鄰 110-1 號)

答:經鏡檢係受粉蝨爲害所引起之徵狀。防治方法：建議參考 1.栽種新株時先予檢查；避免蟲原存在。2.清除栽種園區雜草及去除植株下位葉。3.選用 25%布芬淨可濕性粉 1,000 倍，每 7-10 天噴施一次，並可與 50%馬拉松 800 倍、47%得拉松 1,000 倍等藥劑輪流施用。

二、番荔枝枝條有分泌腊質附著皮上,並有煤污情形,不知何原因？(沈四妹：吉安鄉吉安村中山路三段５８號）

答：經實物檢視係受膠蟲爲害的症狀。防治方法：1.建議參考 44%大滅松乳劑稀釋 1,000 倍或 50%撲滅松乳劑 1,000 倍噴施於若蟲棲息部位。2.施藥前剪除枯枝及受害嚴重枝條燒燬。

三、文旦柚葉片黃化,根系根皮層與維管束分離脫落,根部褐變腐敗,請問是何病因？如何防治？(楊坤海：瑞穗鄉富興村 10 鄰 84 號)

答：經染色鏡檢結果爲柑桔線蟲爲害。防治方法：建議土壤混合幾丁質(使用量爲每公頃 3,000 公斤),以增加土內加線蟲天敵,減少線蟲密度,並在樹冠外圍環狀開溝 15 公分深,施用 30%滅線蟲粒劑(每公頃 28 公斤)或 10%芬滅松粒劑(每公頃 30 公斤),或 5%丁基加保扶粒劑(每公頃 80 公斤)或 10%托福松粒劑(每公頃 20 公斤),文旦植株大小狀況加以增減施於溝底,覆土並保持適當濕度。

四、甜椒植株枝條呈水浸狀,褐色病斑,上端萎凋成枯枝狀。(吳錦坤：吉安鄉慶豐村慶南二街 277 號)

答：經實體檢診係感染疫病。防治方法：建議選用 25%依得利乳劑稀釋 2,500 倍,於發病初期噴施,每 5～7 天一次,採收前 20 天停止施藥。

五、梅、李、桃樹主幹及枝條上出現棕褐色或黑色之膠狀樹脂堆積物,不知是何物？應如何處理。(李振中：富里鄉豐南村四維路 69～1 號)

答：經實體檢視係感染流膠病。防治方法：1.注意田間衛生管理。2.選擇 50%貝芬同可濕性粉劑稀釋 750 倍或 25%比多農可濕性粉劑稀釋 5,000 倍或 50%免賴得可濕性粉劑 1,500 倍,發病時每 10～14 天噴施一次。