農友信箱農業諮詢

陳朝欽 1995 花蓮區農業專訊 11：24

一、木瓜心葉萎黃,葉片乾枯,不知何原因？應如何防治。(林春福:花蓮縣壽豐鄉豐山村中山路 183 號)

答:經現場觀察木瓜心葉萎黃係受除草劑嘉磷塞藥害,建議改用砍草方式避免藥害。葉片乾枯有兩種情形 1.紅蜘蛛爲害葉片穿孔後枯乾防治藥劑可參考致以 50%芬佈賜可濕性粉稀釋 1,500 倍噴於葉背。2.葉片佈白色粉狀物係白粉病原爲害,防治藥劑可採用 18.6%賽福寧乳劑稀釋 1,000 倍噴施。

二、斑春蘭葉尖有黃褐色輪紋斑,向內蔓延,不知何原因？(楊春地:宜蘭縣三星鄉拱照村大坑路 5-6 號)

答:經診斷係交鐮胞霉(Alterharia;sp.)爲害,建議採用 70%四氯保淨可濕性粉劑稀釋 500 倍,每七天噴施一次。

三、莉莎蕨發生 1.嫩梢枯死,向下蔓延。2.小葉有黑褐斑點不知是何原因？如何防治。(楊春地:宜蘭縣三星鄉拱照村大坑路 5-6 號)

答:1.嫩梢枯死係疫病菌爲害,建議採用 25%依得利乳劑稀釋 1,500 倍每 10 天噴施一次。2.小葉黑褐斑點係炭疽病菌爲害,建議採用 70%四氯保淨可濕性粉劑 500 倍噴施,每七天一次。

四、樟樹葉上有巢形物,不知何原因,麵包樹枯條乾枯現象請開始如何防治？(陳金惠:花蓮市美崙,花蓮縣家畜疾病防治所)

答:樟樹葉受樟綴葉螟爲害,防治方法可剪除巢形物燒毀之減少蟲源,藥劑可參考以 90%納乃得可濕性稀釋 3,000 倍噴於葉部。麵包樹枝條受天牛爲害,防除方法可參考施用 40.64%加保扶水懸粉劑 400 倍於樹枝部份(應特別注意安全用藥措施