

# 加強「蘭花文旦」冬春季節之栽培管理 以提高品質

冬、春兩季是文旦生育期之休眠到花芽分化期及春梢萌芽與開花幼果期，對未來文旦果實的品質頗為重要。此期間之田間作業，包括冬季清園、整枝修剪、基肥施用、土壤改良及病蟲害防治等；為確保文旦品質及本區「蘭花文旦」之優質品牌信譽，請果農加強冬、春季節的栽培管理。

冬季整枝修剪時，應同時進行田間清園，尤其樹勢弱者或結果多者宜早進行。樹體中央過高徒長枝及茂密之枝條，應逐年整枝，內側枝亦一併加以修剪，以達成矮化為原則，並增加果樹的受光量，兼顧通風；並注意枯枝、病蟲害枝之剪除。越冬休眠期可噴施95%夏油乳劑95倍添加50%馬拉松乳劑800倍液進行清園防治。

施用有機肥料方面，生產60公斤之文

旦果樹，以腐熟堆肥30~40公斤左右為宜，在化肥方面，則施用全年用量的40%，約1.5公斤之複肥台肥5號，可利用樹冠下開溝施用。如果土壤略酸性，在基肥施用後20天左右視情況每分地可施用100~150公斤之苦土石灰等加以改良，使土壤酸鹼性值在5.5~6.5之間。春梢萌發前後，約在2~3月間，視樹勢發育情況，以複肥台肥5號為追肥，用量為全年的30%，每棵施用1.1公斤左右，配合雨後土壤潮濕施用。春梢萌發及開花、幼果期應針對病蟲害特別注意防治，尤其滿花期易發生薊馬為害，春梢之嫩葉及幼果期易感染白粉病、蚜蟲、葉蟎、潛葉蠅等，均須參考植物保護手冊加以防治。