九十七年七月主要作物病蟲害預測

陳任芳

作物別	病蟲害種類	發生時間	防　治　要　點
玉　米	玉米螟	上、中旬	採用釋放寄生蜂，飼料玉米以加保扶粒劑等藥劑施用，食用玉米採用蘇力菌噴施。
落花生	葉斑病	全月	病斑出現時即行選用鋅錳乃浦可濕性粉劑等藥劑防治，每10天噴施一次。
	小綠浮塵子	全月	發生初期選用50%加保利可濕性粉劑500倍防治。
雜　糧 蔬　菜	斜紋夜蛾	全月	1.採用性費洛蒙誘殺雄性成蟲。 2.初齡幼出現時，於傍晚噴施畢芬寧、陶斯松等藥劑。 3.田埂、溝壁亦應同時施藥。
芋	疫病	全月	1.注意氣象預報，連續雨天或停雨時，即噴施藥劑。2.選用三元硫酸銅等藥劑噴施。
青　蔥	甜菜夜蛾	全月	1.栽種田區懸掛性費洛蒙緩釋劑誘殺雄性成蟲。 2.選用因得克、因滅汀、蘇力菌等防治之。
蔬　菜 瓜　果	銀葉粉蝨	全月	1.清除園區附近雜草、林木等減少棲息場所。 2.每一葉片逾5隻選用畢芬寧、阿巴汀、益達胺、布芬淨、培丹藥劑，並配合黃色粘紙使用防治。
十字花科蔬菜	黃條葉蚤	全月	發現有該蟲初期發生時可選用培丹或阿巴汀等藥劑噴施。
文　旦 柑桔類	銹蜱	全月	幼果、小果期爲防治適期，可施用可濕性硫磺、克芬蟎、芬普蟎等藥劑。
	星天牛	全月	樹幹部分塗佈石灰乳或包覆塑膠布或施用40.6%加保扶水懸劑避免天牛成蟲產卵於樹幹。
果樹類	果實蠅	全月	1.全面懸掛果實蠅誘殺板，以徹底防治果實蠅，降低該蟲密度，減免果實被害。 2.密度高時以水解蛋白質等食物誘引劑加芬殺松於果園四周噴施誘殺。