

作物別	病蟲害種類	時 期	防 治 要 點
水 稻	葉 稻 熱 病	全 月	病斑開始出現時，施用加普胺、保米黴素、熱必斯、護粒丹、鋅錳乃浦、三賽唑等藥劑。
	葉 稻 熱 病	中 下 旬	1.適度施用穗肥。2.抽穗前7天施用三賽唑、熱必斯、鋅錳乃浦等藥劑預防，齊穗再施藥一次。
	白 葉 枯 病	全 月	1.避免偏施氮肥。2.晨露未乾前，避免進入稻田，減少人為傳染。3.常發病稻田應於幼穗形成期前施6%撲殺熱粒劑預防。4.病斑初現時以10%克枯爛可濕性粉劑或10%鏈四環黴素可濕性粉劑噴施。
	紋 枯 病	全 月	選用賓克隆、待克利、滅紋、鐵甲砷酸鉍、貝芬同、維利黴素等藥劑防治。
	螟 蟲	中 下 旬	1.田間成蟲出現高峰後7-10天以撲滅松乳劑等噴施。2.尤須注意孕穗、抽穗前期之施藥防治。
落 花 生	葉 斑 病	全 月	病斑出現時即行選用鋅錳乃浦可濕性粉劑等藥劑防治，每10天噴施一次。
	小 黃 薊 馬	全 月	生育初期用達馬松溶液防除，每10-14天噴施一次，共2次。蓮花田以亞滅培、益達胺等藥劑噴施。
雜糧、 蔬菜	斜 紋 夜 盜	全 月	1.採用性費洛蒙誘殺成蟲(雄)。2.幼蟲於初發生時選用畢芬寧、陶斯松等藥劑噴施。
	銀 葉 粉 蝨	全 月	1.採用32目防蟲網隔絕成蟲。2.利用畢芬寧、益達胺、阿巴汀等藥劑防治。3.清除雜草。
文 旦	銹 蟬	全 月	幼果、小果期為防治適期，可施用可濕性硫磺、克芬蟎、芬普蟎等藥劑。
	星 天 牛	全 月	樹幹部分塗佈石灰乳或包覆塑膠布或施用40.6%加保扶水懸劑避免天牛成蟲產卵於樹幹。