農友信箱

徐保雄、楊大吉 1999-03 花蓮區農業專訊 27:21

一、艷紫荊葉背佈滿銀白色會飛小蟲，致黃化落葉、生育不良現象，如何防治？（花蓮市公路局花蓮公務段）

答：1.經實物及實地取樣檢診係受螺旋粉蝨爲害。

2.防治方法（參考）：

(1)適度修剪枝條。

(2)害蟲初發生時以 2.8%第滅寧乳劑或 2.8%畢芬寧乳劑 1,000 倍噴施，每七天一次連續 2～3 次。

二、柑桔（茂谷）果實皮部有瘤狀突起，變厚粗糙而致生育不良，如何防治？（吳振禎・瑞穗鄉富興村）

答：1.依所送之實物檢診係感染瘡痂病。

2.防治方法：初發生時以 40%快得寧可濕性粉劑 500 倍或 70%晴硫昆可濕性粉劑 1,000 倍噴施，每 15 天約連續 2 次。

三、金針花梗有點斑出現，致外觀不佳且影響生育，如何防治。（周慶南・玉里鎮高寮）

答：1.經實物檢診係受薊馬爲害。

2.防治方法（參考）：

(1)初發生時以 90%納乃得可濕性粉劑 3,000 倍或 50%培丹水溶性粉劑 1,000 倍噴施，每 14 天一次。

(2)注意安全採收期。

四、黑板樹等樹木心葉捲折、落葉或成枯枝，如何防治？（瑞穗・東海岸風景區管理處）

答：1.經現場實物檢診係受捲葉蛾爲害。

2.防治方法（參考）：幼蟲初發生捲葉時即以 22.5%陶斯松乳劑 1,000 倍或 2.8%芬滅寧乳劑 1,000 倍防治。

五、番石榴新梢心葉部有蟲體孳生致佈滿媒灰物，並有螞蟻活動，如何防治？（黃紹奎・吉安鄉慶豐村，簡義明・吉安鄉仁和村）

答：1.經實物檢診係受蚜蟲爲害。

2.防治方法：

(1)初發生時以 40.8%陶斯松乳劑 2,000 倍或 2.8%賽洛寧乳劑 2000 倍噴施一次。

(2)注意安全採收期。

六、番石榴果實褐變且腐爛生黴狀物，如何防治？（劉興泉．壽豐鄉農會推廣股）

答：1.經實物檢診係雨期中感染炭疽病。

2.防治方法：

(1)可選用 50%撲克拉錳可濕性粉劑 4,000 倍或 53%腐絕可濕性粉劑 1,200 倍，於雨停後噴施，每七天一次。注意安全採收期。

(2)配合撿拾落果、病果，清潔園區。

七、豇豆、小胡瓜幼嫩葉背部有銀白色蟲體且會飛影響生育，如何防治？（楊萬福、余建煥．吉安鄉永興村）

答：1.經田間實物檢診係感染炭疽病與蔓枯病。

2.防治方法（參考）：

(1)害蟲初發生時即以 9.6%益達胺溶劑 1,500 倍或 2.8%畢芬寧乳劑 1,000 倍噴施，每七天一次共二次。

(2)注意安全採收期。

八、甜椒葉片上有暗綠色斑點、邊緣水浸狀落葉或枯萎，如何防治？（許鎮榮、林進樹等．瑞穗鄉瑞穗村）

答：1.經實地、實物檢診係感染細菌性斑點病。

2.防治方法：

(1)發病初期以 81.3%嘉賜銅可濕性粉劑 1,000 倍或 27.2%三元硫酸銅水懸劑 500 倍噴施，每隔七天一次，連續 2～3 次。

(2)注意安全採收期。