

茶樹更新技術之應用

◆文／蔡俊明、張清寬、廖慶樑
◆圖／蔡俊明

茶要青大在中，但現心台雨分忽、根吸收益，重以為多期。的青為，質，化樹分菁收頃為種等大週佳衰之要型機料酸茶養茶農公仍品號齡育最早植主候有肥壤使、，茶千茶培三樹生益勢栽因氣中學土，分衰響一，栽十；樹效樹區原的壤化致變水早影萬冠樹、%茶理現地其濕土用導劣響勢而二之茶號50是管發拔；多成使，質影樹進約民前二積正營園海顯溫溫造期作性，起，積農目十面，經茶高明高易長耕化良引降面居，茶培上，分中為帶，上化理不而下園入物台栽以期部是最熱季加理、育因均茶收作、佔生壯有其種亞夏，合化發，質均濟龍約年、前尤品於中失園退長能品台灣平經島，五青目，龍位集流茶力生功與農之心宗十之是象島灣量解略地系收量。

栽短，決確間型可以已化新、支量實、羅密、法
濟縮象解正田：樹可枝老更、老分產，、部良少無
經在現。用照項，時分口法衰常、法、多基不減已
般現常善應依幾，密此面對方嚴重、嚴刈缺枝排收方
一，正改如何，列枝，冠易剪勢象病台樹、圍吸枝。
物，年不法如法為下降。樹容剪樹現枯用茶枯茶、剪更新。
作三，須設農方分樹下復。樹且深樹葉枝採：乾、疏述更
生持年亟導更可茶質恢樹：低採樹落且可植條物稀上全園
年維十，輔及大致：品勢茶、用樹枯，則種枝植系用應
多可二益強復度剪量促使枝率宜刈乾多，新、類根利，復
為至少效加恢程中產法深萌薄、台現枝降新、嚴重薺、恢
樹至年營為勢老、是方、芽變、呈爪劇更、嚴苔實乏，樹
茶限五經，樹衰一只枝二茶層。三已難質勢四害衣密缺勢
年十低道樹勢佳剪、葉勢條，品樹蟲地壤分樹
培為降之茶樹尚中疏、樹枝少與施病生土養使



不地保在管分基冠範茶園視劑作之園間發
是土水，培次之樹分供茶重藥工摘茶期與
要的由失栽層植之公提之需及等採，旱長
要上且流視應培大十為法更料草及冠亢生
重以，石重養為寬九，合，肥除枝樹，群
最過55%，輔導止必冠條好十部境工作學、剪之施根。
植超予防則樹枝良六理環持少中養優溉茶全發展。
新度不以農之壯氣在管長保減施蓄養灌利健
或坡府，茶部健通持壤生土，實的培及以之
新用政締，上之成維土的生理時條以源，冠
更樹取後地生養宜在好強管按枝，水溉樹
園利茶以新中密而高外良加培，意配靠灌
茶限植予更其使進樹另部須肥用注搭可時促
得超種位園，，，。根必園使並理有適，合應可育