

新推廣茶樹害蟲

防治藥劑（七十九年～八十四年）

■文圖／曾信光

藥劑名稱	防治對象	每公頃每次施用量	稀釋倍數	注意事項
1%密滅汀乳劑 (Milbemectin)	神澤氏葉蟎	1公升	1,000	1.採收前6天停止施藥。 2.具輕度皮膚刺激性，對魚劇毒，禁用於水域、空中施藥或大面積施用。
2.8%畢芬寧乳劑 (Bifenthrin)	茶葉蟎	0.5公升	2,000	1.採收前12天停止施藥。 2.對眼具強刺激性，對皮膚具中度刺激性。
20%畢達本 可濕性粉劑 (Pyridaben)	茶葉蟎	0.5公斤	2,000	1.採收前12天停止施藥。 2.對蜜蜂毒性高，開花期禁用。
5%芬普蟎水懸劑 (Fenpyroximate)	茶葉蟎	0.5公升	2,000	1.採收前12天停止施藥。 2.對水生生物毒性極高，禁用於水資源保護區。
2.8%畢芬寧乳劑 (Bifenthrin)	茶捲葉蛾	0.5公升	2,000	1.採收前12天停止施藥。 2.對水生生物劇毒及對蜜蜂毒性高。
2.8%畢芬寧乳劑 (Bifenthrin)	茶小綠葉蟬	0.5公升	2,000	1.採收前12天停止施藥。 2.對水生生物劇毒及對蜜蜂毒性高。