

適合添加於茶葉之香花植物簡介(三)

文圖 / 茶作課 李臺強

(11) 柚子（文旦、拋、柰）：

學名 *Citrus maxima* 芸香科柑橘屬，原產中國，為常綠喬木，高可達5~10公尺，花期4~5月，色潔白、味芬芳，開花期為10~15天。台灣傳統的柚花茶，就是利用柚花與茶薰製而成。台灣盛產柚子，面積大、產量高、種類多，除收果外其花為薰製花茶的原料。柚樹開花比茉莉、梔子、株蘭都早，花期集中，薰製柚花茶可提前供應市場。柚花茶香味厚重適度，頗受人們的喜爱。柚花由於味厚，同時香型比白蘭更易於與茉莉花吻合，所以在薰製茉莉花茶之前可用柚花打底，也可以在薰製茉莉花茶過程按比例改加一些柚花混合薰製，這樣不但提高茉莉花茶品質，又可節省茉莉花。花蓮縣部分茶農和柚農合作，在文旦柚花期，將篩下的文旦柚花加以烘焙，混合烏龍茶成為「文旦柚花茶」，讓喜愛花茶的消費者為之驚豔。




用途：1.花潔白芳香，觀賞價值較高，是庭院的觀果樹種，亦可盆栽觀賞。2.果肉香甜，可食用。3.花可做薰花茶材料。

(12) 梔子花（黃梔子花、黃枝花、山梔子、黃梔子花）：

學名 *Gardenia jasminoides*

屬茜草科梔子屬。原產中國福建，常綠小喬木或灌木高約1~2公尺，生長力強，莖灰色、小枝綠色，倒卵形或矩圓狀倒卵形，花單生於枝頂或葉腋，花大，花冠高腳碟形，花冠白色、有濃郁花香、花期短，果黃色，卵狀至長橢圓狀，通常栽培4、5年後才能開花，4~6月開花，約一個月之久，果期5月~翌年2月。所以茶葉如欲採用黃梔子花薰製，只得配合於5、6月之間薰製完成。每公頃產花量約9000公斤。喜溫暖、濕潤及光線充足的環境，不耐寒，耐半蔭。喜疏鬆、肥沃、排水良好的酸性土壤。



用途：1.花可提煉芳香油。2.花枝可用於切花，也適合庭園、池畔、路旁栽培觀賞。3.果可作染料。

(13) 白蟾（重瓣梔子）：

學名 *Gardenia jasminoides* var. *fortuniana* 屬茜草科梔子屬。原產中國及日本，常綠灌木，株高約1~2公尺，莖灰色、小枝綠色，單葉對生或3葉輪生，葉片革質，倒卵形或矩圓狀倒卵形，花單生於枝頂或葉腋，花大，重瓣，白色具濃香花期4~6月。果黃色，卵狀至長橢圓狀，果期5月~翌年2月。喜溫暖、濕潤氣候，喜光，耐半蔭，不耐寒。以疏鬆、肥沃、排水良好的酸性土壤為佳。



用途：1.花可提煉芳香油。2.花枝可用於切花栽培，適合庭園、公園、校園及居住區栽培，多叢植。

(14) 樹蘭（碎米蘭、珠蘭、珍珠蘭）：

學名 *Aglaia odorata* 棟科樹蘭屬，原產中國廣東省、華南、馬來西亞、印尼和印度等地，屬常綠小喬木，株形酷似七里香，株高約4~7公尺，花黃色，小如粟米，具花香，成圓錐花序，4、5月及9、10月開花二次，種植初期開花較少，4~5年以後開花量增加，至第七年年均每株可採收花12公斤，每年可採收4次其中2次大收，2次小收，採收時將整枝花序剪下，輕輕揉搓，小花梗可掉落，鮮花供包種茶薰香用，乾花則供做柱香的香料。部分福建、台灣茶廠利用樹蘭薰製樹蘭花茶。

用途：1.庭園樹種。2.鮮花為包種茶之薰香材料。3.乾花為柱香的香料。



(15) 夜香木（夜來香、夜丁香、夜香花、夜香玉）：

學名 *Cestrum nocturnum* 屬茄科夜香木屬，原產熱帶美洲和西印度，常綠灌木，株高可達二公尺以上，分株多且柔軟，葉互生，花頂生或腋生，呈總狀花序，花小、花色青黃到奶油色，具有濃郁花香，花期3-10月，生性強健，以扦插法繁殖，一年四季均可實施。


用途：1.花具有濃郁香氣，可當香花植物栽培。2.香氣可提煉出精油，供工業用途。3.花枝可當花材利用。



(16) 金粟蘭（珠蘭、珍珠蘭）：

學名 *Chloranthus spicatus* 屬金粟蘭科金粟蘭屬，原產於中國，草本狀蔓生常綠小灌木，株高20~30公分，成株叢生狀，單葉而對生，花小，頂生成細長的穗狀花序，淡黃色，香氣濃郁可供觀賞又可薰花，一年開花一次，花期春至夏季，故夏季薰製珠蘭花茶最佳。茶用香花中以珠蘭、茉莉、白蘭、玳玳一起被譽為四大茶用香花。珠蘭花茶，品質優良。似藍花香、口味佳以安徽歙縣栽培較多。在香花作物中，除茉莉、珠蘭以外均稱為「雜花」。繁殖以播種、扦插或分株法繁殖，春秋兩季為適期。性喜溫暖濕潤氣候，光照感應遲鈍，懼寒害。

用途：1.庭園栽植、盆栽。2.花提煉香料。





(17) 緬梔（雞蛋花、印度素馨、鹿角樹、蕃仔花）：

學名 *Plumeria rubra* var. *acutifolia*

屬夾竹桃科緬梔屬。原產熱帶美洲、墨西哥，落葉灌木或小喬木，株高5公尺以上，枝幹極粗，葉長圓狀倒披針或長橢圓形，柔軟多肉，葉互生。花聚傘花序頂生。花冠筒狀，5裂，外面乳白色，中心鮮黃色，極芳香，花期6~9月。性喜乾燥、高溫、高濕及陽光充足的環境、耐旱，但懼寒害，以肥沃和排水良好的沙質土壤為佳。以扦插或播種法繁殖，早春為栽植適期。

用途：1.花清香馥郁，可用來泡茶及提煉芳香料。2.適合庭院、公園、居住區栽培觀賞，也適合盆栽。



(18) 梅花（干枝梅、春梅）：

學名 *Armeniaca mume* 薔薇科杏屬。原產中國，落葉喬木，株高約10公尺，葉互生，卵形，先端長漸尖。先花後葉，花著生於一年生枝的葉腋上，單生，也有兩朵簇生，花色有白、紅和粉紅等，具芳香，單瓣至重瓣。核果近球形。花期1月~3月隨各地氣候有差異。喜溫暖而稍濕潤的氣候，喜光照及通風良好的環境。耐寒、怕濕、耐旱，生長適溫15°C~28°C。喜排水良好的中性至微酸性土壤。

用途：1.花可提煉香精。2.在園林中應用普遍，多叢植、群植、單植於公園路邊、坡地、溪邊池畔和建築物周圍，也多應用於梅花園中，還可製作盆景及盆栽欣賞，是東方式插花的常用花材。3.果實供食用，可製成蜜餞，也可薰製成烏梅入藥。



(19) 薔薇（多花薔薇、野薔薇）：

學名 *Rosa* spp. 屬薔薇科薔薇屬。分佈於北半球之亞洲及美洲。落葉灌木，多為攀援狀，葉互生，具皮刺，托葉明顯，奇數羽狀複葉，葉邊緣有鋸齒。花多朵排成密集圓錐狀傘房花序，花具芳香，花期依品種而異，幾乎四季皆有花，花朵有單瓣或重瓣，小形至大形，各類顏色皆有。果期10~11月。薔薇類一般可分為原生種（含自然雜交種）與人工雜交種兩大類。目前園藝品種甚多（上萬種），每年均有新品種問世。性喜肥沃，排水良好之微酸性粘質壤土。以實生法、扦插法、嫁接法及高壓法繁殖。

用途：1.香氣高的品種，可提煉香水及供做薰花茶。2.花團錦簇，鮮艷奪目，園林中最宜植為花籬或在坡地叢栽，也可作花柱、花門、花架、花格、綠廊及基礎種植。3.是嫁接月季的優良砧木。

參考文獻：

1. 劉祖生. 1993. 茶用香花栽培學。農業出版社
2. 沈培和. 2005. 茶用香花特性及其飲用價值。 | 四小木 | v. 1 |
3. 鍾榮輝、徐暉春. 2008. 香花圖鑑。汕頭大學出版社。

ISSN 1729-2824 00020



9 771729 282008

GPN : 2008100103
定價 : NT \$ 20 元