

# 當歸

*Angelica archangelica*

## ▼ Angelica

屬名：當歸屬

別名：西洋當歸、洋當歸

生長型態：二年生草本植物

光照：部分遮陰至全日照

繁殖季節：秋季9~11月

繁殖方式：種子播種，播種前5°C濕藏6週後播種，有助於提高發芽率

土壤條件：富含有機質之砂質壤土、碎石礫地，pH值4.5~7.0左右

水分管理：水分充足、排水良好環境

### 植株性狀與生育習性

本種為原產於歐洲中部及北部，植株高度可達1.8m，葉片粗大有如明日葉，莖部帶有紅色或紫色，花色綠色至乳白。

### 應用

嫩葉蔬菜用，小花用於糕餅加工香料，莖部幼嫩時用於加工、醃漬，有如嫩蘆筍沙拉食用。

### 主要化學成分

根部及種子精油主要含Beta-pholllandrene, alpha-pinene等物質。

### 近緣植物

白芷為原產於中國華中一帶之當歸屬植物，台灣亦可見其變種散生於大屯山麓、新竹一帶，本地稱之為野當歸、台灣當歸、大本山芹菜 (*A. Dahurica* var. *formosana* Boiss.)。白芷為多年生草本植物，幼年期叢生狀，抽苔後植株高度可達到1~2m高。葉為羽狀分裂，小葉卵形到卵狀披針形，葉緣銳鋸齒狀，葉面糙澀，葉背葉脈具短毛。花序頂生或腋生複繖形花序，小花黃白色或白色。

