

苦艾

Artemisia absinthium

▼ Wormwood, Lad's love,
Common wormwood

屬名：蒿屬

別名：洋艾

生長型態：多年生亞灌木性植物

光照：全日照

繁殖季節：秋季、高冷地春季播種

繁殖方式：播種繁殖，種子細小，每
公克可達10000粒，20℃
10-20天發芽

溫度：4℃以上生長良好

土壤條件：排水良好之微酸性土壤
pH值6.0-6.8

水分管理：耐旱性強，忌澆水

應用

用於利口酒、苦艾酒之釀造
調味、醫藥原料，具保肝活
性用。

主要化學成分

可能含有thujone衍生成分
absinthin等。

近緣植物

南方苦艾 (*A. abrotanum* ,
Southernwood) 株高1m以
上，木本多年亞生灌木，歐
洲常見，原產地不詳。有時
用於啤酒調味香料，含大量
樟腦和limonene衍生物。

植株性狀與生育習性

蒿屬植物可能多達300種以上，變種多達數百種。苦艾原產於歐洲，歸化生長於北美，植株生長高度可達1.2公尺以上，幼齡植株呈銀白色，葉具細茸毛，成株灰綠色，花序頂生，小花黃色。



苦艾，或稱為洋艾 (*A. absinthium*)



銀霧 (*A. schmidtiana* cv. 'Nana')

菊
科

COMPOSITAE