

凡那比颱風後

蓮霧果樹

之災後復育 與復耕措施

文・圖／賴榮茂

凡那比颱風侵襲南台灣，對蓮霧造成嚴重傷害，預估今年新曆年前蓮霧產量會較正常年大幅減少。為了減少颱風豪雨對高屏地區蓮霧造成的損失，本場場長黃德昌率領技術服務團員實地勘查，並呼籲農友，在風災後應



蓮霧花蕾因強風造成擦壓傷

積極採取正確的復育措施，讓蓮霧及早恢復活力，才能生產高品質的果實，供應春節前後暢旺的市場需求。

目前大部分蓮霧已經催花成功，強風除了造成樹冠迎風面的枝葉受損，花芽及花蕾也因颱風前的焚風，及颱風過境時強風豪雨造成風疤及枝葉摩擦，導致外觀受損甚至花蕾掉落。沿海鄉鎮如東港、林邊、佳冬、枋寮等地的果園，因習慣培育一次梢葉就進行催花，受損達3成以上，內陸地區如鹽埔、九如、高樹等鄉鎮的果園，因前培育的梢葉達3次以上，而有較多的枝葉緩衝強風吹襲，受損略輕。

黃場長表示，颱風來襲後，蓮霧應立即依不同的生育階段及受損程度進行正確的復育工作，才能將經濟損

失降至最低。樹冠迎風面受損的植株，災後會在受損部位長出大量新梢，管理的重點在：

- 1.新梢長出時，即以高磷鉀液肥(7:16:35)，噴施葉面減少新梢節數及葉面積，促進新葉提早成熟，避免與花果競爭養分，同時有利於11月份再催花。
- 2.受損的花蕾及花芽應趁此時澈底摘除，以提高葉果比率，則當季雖然產量減少，但仍有採收到高品質果實的機會。
- 3.加強炭疽病的防治，在天氣放晴之後，輪流以23%「亞托敏」水懸劑3,000倍、43.7%「三氟敏」水懸劑3,000倍及40%「克熱淨(烷苯磺鹽酸)」可濕性粉劑1,500倍澈底噴施全株。
- 4.植株因強風搖動，根系受損，災後花果的生長速度減緩，應避免過度施用氮肥，造成品質下降或誘發病害。

黃場長強調，農友在颱風過後，若能正確地進行災後復育工作，將可大大減少此次損害。若有任何果樹災後復育問題，可逕洽高雄區農業改良場果樹研究室(電話08-7746744)，或直接撥打08-7389052或08-7389087技術服務專線，本場將全力提供必要的服務與協助。●



強風豪雨造成樹冠迎風面嚴重折損