



天漸秋涼 雨漸少 慎防

印度棗白粉病

文／曾敏南·圖／莊益源

造成葉片及果實褐化乾枯。

至於病菌產生的大量乾性分生孢子，則可輕易隨風飄散，而快速傳播。由於印度棗果實在幼果期即使受到輕微的感染，也會造成大果期果皮粗糙，而大幅降低商品價值。因此，特別籲請農友在印度棗盛花期，應先採取預防措施，並在整個栽培過程中小心觀察，只要葉片發生白粉病，即應適時防治，以免病菌危害果實。

為預防白粉病的發生，農友應改善果園通風，於開花盛期，如發現白粉病蹤跡時，應採取正確的防治措施。化學防治方面，可選用34.5%貝芬菲克利水懸劑、50%三氟敏水分散性粒劑或10.5%平克座乳劑進行防治(或參考植物保護手冊之其他推薦藥劑)。每7~10天施用一次，共3~4次，並嚴格遵守安全採收期的規定。如有用藥或防治上的問題，請逕洽高雄區農業改良場(08-7389158轉761)，技術人員將竭誠為您服務。●

印度棗果實受白粉病感染，病菌的菌絲及孢子猶如一層薄薄的麵粉。

高屏地區栽種的印度棗已進入開花或小果期，而氣候漸涼、雨水漸少的環境，是印度棗白粉病最適合發生的條件，若未小心防範，易造成日後果皮褐化粗糙，大幅降低商品價值。

印度棗白粉病是由病原真菌所引起，好發於涼冷乾燥、通風不良的環境，病菌可由印度棗葉片、花器及果實表面直接侵入感染，於危害部位產生白色菌絲及分生孢子，外觀猶如在患部撒上一層薄薄的麵粉，嚴重時，