台東地區氣候高溫多濕
請注意水稻稻熱病防治



近來氣溫逐漸上升，而且相對濕度也高，這種高溫又多濕的氣候環境正是水稻稻熱病最容易發生的時候。而溫度高低不定的環境下更會減低水稻的抵抗力，引起發病，另外多施氮肥亦會減低稻的抵抗力，發生時不可偏施氮肥，以免加劇蔓延，維持三要素之適當比率可減輕病害發生。葉稻熱病發病初期先於葉面上形成褐色或暗綠色子斑點，如環境適合，擴大成紡錘形，此時病斑周圍呈黃色，中間為亦褐色，一般穗頸及枝梗上的病斑呈淡褐色或暗褐色，穀粒之病斑則為暗灰色或白色。發病後穀粒不充實或不稔。

目前本縣一期稻作即將進入孕穗期，為防止稻熱病的發生，請農友根據「植物保護手冊」所推薦的藥劑其中一種來防治：在葉稻熱病方面，有七五%三賽唑可濕性粉劑每公頃〇．三三公斤三〇〇〇倍；五四%保米熱斯可濕性粉劑每公頃〇．六六公斤一五〇〇倍；四三%嘉賜貝芬混合可濕性粉劑每公頃一公斤一〇〇〇倍等。穗稻熱病的防治葯劑有五四%保米熱斯可濕性粉劑每公頃〇．八公頃一五〇〇倍；五０%熱必斯可濕性粉劑每公頃一．二公斤一二〇〇倍，及五〇%護粒三賽唑可濕性粉劑每公頃〇．八公斤一五〇〇倍等，均可採用。而防治穗稻穗熱病的發生須於孕穗期及齊穗期各施藥一次，方能有效預防，請各位農友注意加強防治。

