

熱帶果樹介紹——嘉寶果(樹葡萄)



植株型態

嘉寶果又名樹葡萄，英名 Jaboticaba，學名 *Myrciaria cauliflora* Berg，為桃金娘科 (Myrtaceae) 之多年生果樹，原產於巴西，主要分布在南美洲，臺灣目前在中南部有少量栽培。嘉寶果在巴西分布範圍從海平面至910公尺，主要栽培品種有 'Sabara'、'Paulista'、'Rajada' 等，其植株高度10~12公尺，果實直徑在1.6~4.0公分，在南美洲嘉寶果以鮮食為主，也可以用來釀酒；果肉部份可加工製作果凍、果醬或果汁；惟果皮含單寧，食用時最好去除。

嘉寶果為熱帶常綠灌木，喜溫暖潮濕之氣候；根系淺不

耐旱，適合栽培在偏酸性土壤中生長較好，土壤pH值範圍5.5~6.5時最適合。植株生長勢強生長旺盛，但幼年期較長約需5~7年才會開花結果，可利用靠接或高壓等方法縮短幼年期，只需3~5年即可開花結果。嘉寶果病蟲害少，但在多雨季節容易引發灰黴病，蟲害方面新梢期及花期有蚜蟲危害及生育期中紅蜘蛛可危害中、老葉之葉背，另於果實成熟期有東方果實蠅危害發生。

嘉寶果樹皮薄呈現淡褐色，葉片為長橢圓形，嫩葉帶淺紅褐色。每年有兩個開花期，分別為2~4月與8~10月，花為



花及幼果



開花

幹生花，白色單生或簇生於樹幹上；果實具短果柄，果皮光滑結實，成熟時由淺綠色轉為鮮豔的紫紅色，分別於3~5月與9~12月間成熟，單果重約

5~12公克，果肉白色半透明，成熟後風味特殊，呈半透明膠質狀，果肉甜度約在12~18°Brix左右，每100克果肉維生素C含量26~35毫克，種子1~4枚。

嘉寶果之條型態優美，適合臺灣氣候栽培，可作為盆景



成熟果實及剖面

及庭園用樹；其果實具特殊的熱帶風味，亦可釀酒及加工為冰品、蜜餞等，惟採收後鮮果容易失水、發酵，建議低溫冷藏以延長食用時間。嘉寶果雖需5~7年才會開花結果，但隨著休閒農業風潮興起，可觀賞、可鮮食、可加工的多用途果樹——嘉寶果，不失為休閒農場中少量多樣化的栽培選擇。