稻熱病 蠢蠢欲動，請農友及早防範

文．圖／曾敏南、黃檮昌



葉稻熱病典型紡錘形病斑(黃檮昌場長提供)

根據本場分析資料顯示，目前高屏地區日夜溫差較大，已逐漸出現稻熱病蹤跡，加上高屏地區之水稻已進入分蘗盛期，此時正是稻熱病好發階段，因此籲請農友適時採行防治措施。

本場黃檮昌場長指出，稻熱病菌可危害葉片、稻穗、莖節及葉舌，主要病徵為發病初期，於葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，若環境適合病勢進展，則擴大呈紡錘型。病斑周圍呈黃色，中間灰褐色，嚴重時葉片枯萎，如感染稻穗則造成穀粒不充實。相對溼度高於90%以上時容易發病，溫度高低變化劇烈，易減低水稻的抵抗力，使病害更加嚴重。

稻熱病在一期作較易發生，一般而言，水稻插秧後35~50天最容易遭受感染。目前在高屏地區已零星發生，受害率約2%~5%，本場已發布葉稻熱病警報，籲請農友多觀察田間稻熱病發生情形，一旦發現病勢進展，應立即施藥防治，避免病害擴散蔓延。

稻熱病的防治方法，應依據植物保護手冊規定，選用適當藥劑進行防治，例如15%加普胺水懸劑、20%嘉賜三賽唑可濕性粉劑或50%富米熱斯可濕性粉劑等。

黃場長特別強調，藥劑施用之濃度與次數，應依照推薦方法，避免產生藥害。此外，在肥培管理方面，應注意三要素的適當比率，氮肥切勿過重施用，可減輕受害程度。農友在稻熱病防治上若有任何問題，可逕洽本場技術人員，將竭誠為您服務(電話：08-7389060)。

葉稻熱病防治，可任選一種下列藥劑，或選用植物保護手冊推薦之其他藥劑進行防治。

藥劑名稱	每公頃施藥量	稀釋倍數	施藥方法及注意事項
20% 嘉賜三賽唑可濕性粉劑	0.67公斤	1,500	發病初期施藥一次，10天後再施一次。
15% 加普胺水懸劑	1公斤	1,000	發病初期開始施藥，每隔10天施一次，連續三次。
50%富米熱斯可濕性粉劑	1公斤	1,000	發病初期施藥一次，7~10天後再施一次。