

# 番荔枝夏季修剪需掌握時機

番荔枝(釋迦)為臺東地區主要經濟果樹，夏季修剪之主要目的在維護樹型及期調節生產冬期果。夏季修剪所需注意事項分述如下：

## 一、修剪期間：

一般於6月上旬至9月中旬間施行。但近年氣候變化異常，以9月上旬(白露)前修剪開花率較高，太遲修剪開花數少甚至不開花，尤以秋季日照較短、氣溫較低之地區更為明顯，農友應特別留意，儘量提早修剪。



圖1.未行夏季修剪疏枝之植株日照、通風不良

## 二、夏季修剪方法：

(一)維護樹型之修剪：以疏刪為主。

番荔枝植株於2-3月間施行強剪(冬季修剪)，促使4-5月間萌發大量

春梢與不定芽，造成樹冠內日照不足、通風不良，不但浪費養分且易罹病蟲害，如圖1。夏季修剪時可疏剪密生枝、纖弱細枝等，使樹冠內部通風良好，改善日照，如圖2。萌生於主幹附近直立向上之徒長枝，應及早剪除，若不剪除因其頂端優勢較強，將呈一枝獨秀，影響產量及品質。故夏季修剪為維護樹勢之疏枝作業，愈早施行愈好，以減少養分消耗及病蟲危害。

夏季修剪不宜強剪，以免影響掛留樹上之夏期果實發育及品質，同時避免剪除太多枝梢，影響樹冠遮蔭，致使枝條或果實發生日燒現象，減低果實商品價值。

(二)產期調節之修剪：以短截去葉為主。

夏季修剪需配合夏期果管理與採收同時進行，主要選擇著生於樹冠內部及下半部之主幹、主枝、亞主枝等永久枝上之側枝或春梢發育充實者短截為6-10公分(含2至3個芽)，並去除短截枝上之葉片，以促使萌芽開花，如圖3。若不去葉，花芽萌發較



圖3.夏季修剪—將春梢短截為6-10cm後去葉



圖4.短截後枝條開花情形

遲或不萌芽。如能配合灌溉作業，更可促進萌芽及生長整齊，修剪後約7-10天萌芽，陸續開花著果，如圖4。

基於氣候情況、勞力需求與衡酌樹勢發育，可依現況將夏季修剪調整為1-2次，以維持產量與品質達最佳狀況。番荔枝雖於7至8月盛暑期間施行修剪，調節產期，生產冬期果實，於樹冠內部及下半部實施，可避免果實日燒且不會因季節風而造成果實擦傷，影響外觀及品質。

番荔枝經由夏季修剪，可培養11月至翌年3月間之冬期果，除延長供果期外，更可增加產量及避開其他水果盛產期與颱風季節，有助農民收益。



圖2.夏季修剪疏枝後植株