

臺東地區發生局部性豪雨，請農友做好農業防災復育措施

本場呼籲臺東地區的農友，雨後注意農作物病蟲害防治，未達農業安全用藥期之蔬果，不宜採收。

番荔枝(釋迦)

- ①注意颱風氣象預報，整修清理園間集、排水溝渠，保持水流的暢通，已達採收期的果實，儘快採收，唯未達農業安全用藥期之番荔枝果實，不宜採收。
- ②風雨過後，傾斜或倒伏的植株，不要勉強扶正，應該在地上部立支柱固定，並在根際處順勢培土，以保護根系，同時適度修剪，倒伏嚴重的植株，可採用強剪(約剪除全株枝條的1/2至1/3量)，減少水分蒸散以維持樹勢。
- ③強風導致植株嚴重落葉、折枝，容易造成雨後果實日燒傷害，應該以紙袋進行果實套袋。
- ④風雨過後病害最容易發生蔓延，應立即剪除折枝、清除斷枝、落果，搬離園或集中埋入土中，隨即全園噴施50%「撲克拉錳」可濕性粉劑6,000倍或50%「貝芬同」可濕性粉劑750倍，以防枝條的赤衣病及果實的黑腐病。
- ⑤酌量施少量三要素肥料以增強樹勢。

水稻

- ①整修清理田間或育苗場所集排水溝渠，保持水流的暢通。
- ②風雨過後，儘快進行病蟲害的共同防治。
- ③災後稻田應補施少許氮鉀肥，以維持稻株的生長勢。

瓜果菜類作物

- ①風雨後儘快採收成熟瓜果，未達農業安全用藥期之瓜果，不宜採收；排除田間積水，清除折損的莖蔓及葉片。
- ②風雨侵襲後，瓜類全面噴施58%「鋅錳滅達樂」可濕性粉劑400倍、74.1%「銅滅達樂」可濕性粉劑400倍、64%「鋅錳歐殺斯」可濕性粉劑500倍或50%「達滅芬」可濕性粉劑4,000倍液，以預防疫病(水傷)發生，噴施時應混合24.9%「待克利」乳劑3,000倍或25%「撲克拉」乳劑3,000倍，以同時預防葉片及果實的炭疽病；茄科作物如番茄、甜椒則可噴灑37.5%「氫氧化銅」水懸劑400倍以預防細菌性斑點病。
- ③災後立即補施追肥，每分地施用尿素20公斤(或硫酸銨44公斤)及氯化鉀4公

斤，以回復植株的生機。

葉菜類作物

- ①風雨後儘快採收成熟蔬菜，唯未達農業安全用藥期之蔬菜，不宜採收。
- ②風雨過後儘快排除田間積水，清除折損的莖蔓及葉片，並保持排水系統暢通。
- ③未達採收期的蔬菜，於風雨侵襲後，全面噴施25%「汰芬隆」水懸劑、30%「佈飛賽滅寧」乳劑1,000倍或其他政府推薦的藥劑防治斜紋夜盜蟲；結球白菜同時噴灑68.8%「多保鏈黴素」可濕性粉劑1,000倍，以預防細菌性軟腐病；其他十字花科蔬菜噴灑81.3%「嘉賜銅」可濕性粉劑1,000倍，以預防黑腐病發生。
- ④災後立即補施追肥，每分地施用尿素20公斤(或硫酸銨44公斤)及氯化鉀4公斤，同時進行中耕培土。

小米烹調法

小米稀飯

小米煮稀飯可以單獨煮小米粥，亦可摻綠豆、紅豆、薏仁、蓮子、麥