

# 臺東地區枇杷病蟲害防治



幼果期套袋前需施藥預防炭疽病潛伏感染後再行套袋

枇杷亦是臺東地區的重要經濟果樹，由於產期比西部產區早，價格看俏，每年為臺東枇杷果農帶來很高的收益。惟枇杷在生長的期間所遇到的各種問題，以病蟲害最為棘手，茲將重要的病蟲害之發生與防治說明如下，提供果農防治之參考。

於春梢期(約2-4月)桔捲葉蚜(俗稱龜神)之成若、蟲群聚新葉及嫩梢上取食危害，被害葉片初呈捲曲，嚴重時春梢無法長出。防治適期需把握蚜蟲在初期發生時，趕緊採取藥劑防治，可選用與花薊馬、椰子橢圓盾介殼蟲及小白紋毒蛾等同時一起防治之藥劑如2.8%賽洛寧1,000倍或20%芬化利1,000倍，全園噴施一次。

夏梢期時(約5-7月)會有赤衣病、灰斑病及芽蟎等之發生，赤衣病在一般通風不良的果園比較容易發生，因此在採收後，除將徒長枝留2-3葉外，其餘的葉片全部去除，以增加其通風性。其防治方法：①剪除發病枝條，集中燒燬，不可任意棄於果園內；②藥劑防治：可選用50%貝芬同可濕性粉劑750倍來防治，於發病初期防治一次，嚴重時

每隔10-14天再施藥一次。

灰斑病，可危害葉片、枝條、幼果期及成果期等，罹病後，被害嫩葉初呈褐色的圓斑點，後期造成葉片黃化，嚴重時導致落葉現象；幼果罹病時，造成果皮有褐色的圓斑點，大果及果實成熟期時，在果皮上有灰色斑紋。其主要的發生期在5月上旬至7月下旬期間，藥劑防治故須把握發病初期，可選用33.5%快得寧水懸劑1,000倍、或37%護矽得乳劑5,000倍、或25%克熱淨500倍等藥劑防治，以上之藥劑最好輪流使用，俾減緩抗藥性之發生。

芽蟎全年均會發生，但以乾燥、雨水少之期間，密度較高，被害心葉芽呈現紅心症狀，其防治藥劑可選用85%加保利可濕性粉劑850倍或20%畢達本可濕性粉劑2,000倍等，於乾旱季全園施藥防治。

秋梢期(8-9月)，應注意灰斑病的發生，可選用25%克熱淨500倍、37%護矽得乳劑5,000倍或10%平克座乳劑2,000倍輪流使用；進入開花期及結果期，即10月至12月期間，果實亦會感染灰斑病，需於幼果發病初期再施藥防治一次。害蟲則以花薊馬(俗稱花苔或雞筍)可危害花器及幼果，影響結果率及果實外觀等，每年發生盛期於10月中旬至11月間，其防治藥劑可選用2.8%賽洛寧乳劑1,000倍或3%亞滅寧乳劑1,000倍，於薊馬發生初期開始防治。

其次是葉蟎(俗稱紅蜘蛛)，於乾旱

、雨水少之季節(6至7月及11至翌年2月)發生嚴重，被害葉片呈銹色小斑點，其防治藥劑可20%畢達本可濕性粉劑2,000倍或新殺蟎乳劑500倍等防治一次。

至於枇杷田間栽培管理及病蟲害防治時，請加強下列事項：

- ①果樹修剪時應保持果園良好的通風及日照。
- ②必須施用完全腐熟的有機肥，避免使用新鮮的雞糞等動物性糞肥減少蒼蠅孳生及配合果園環保。
- ③幼果期避免使用過量的氮肥。
- ④強風豪雨過後需預防灰斑病之發生，並將罹病枝條集中燒燬。
- ⑤幼果期套袋前，需預防炭疽病潛伏感染，可選用23%亞托敏水懸劑2,000倍防治後再行套袋。
- ⑥生長期間應保持結果枝有20至23葉片，採收後，將枝條留2-3葉，其餘葉片摘除，並加強介殼蟲防治。

(謝進來 325110轉735)



開花期及幼果期需預防花薊馬危害