



番茄夜蛾發生與防治

番茄俗稱柑仔蜜、臭柿子等，為1至2年生植物，屬於春

、秋季栽植作物，而臺東地區除了春、秋兩季外，更可於5至8月間夏季高溫栽種耐熱品系，每年為番茄菜農增加許多收益。但栽培期間番茄夜蛾常造成心梢及果實等發育不良，影響產量甚鉅。番茄夜蛾俗稱毒蟲、大綠蟲又稱玉米穗蟲或高粱穗蟲，為雜食性重要害蟲，在臺東地區年發生9至10世代，每年於番茄開花至幼果期大發注，成蟲以花蜜為食，幼蟲以嫩莖、葉為食，或蛀入莖部啃食致植株枯死，開花期啃食花器影響授粉，最主要之危害為初齡幼蟲由果蒂周圍蛀入幼果或成熟中之果實啃食致果實腐爛無商

品價值。幼蟲有自相殘殺習性。老熟幼蟲鑽出果實於土中化蛹。

防治方法：

- ①於移植前在畦面開溝深15公分，以3%加保扶粒劑，每公頃60公斤或10%托福松粒劑每公頃15-20公斤，行條施後覆土，再移植。
- ②移植後約30-35天時正值番茄開花至幼果期發現有番茄夜蛾危害時以32.5%硫敵克1,000倍、40.7%陶斯松1,000倍或2.8%第滅寧1,500倍全園施藥一次。
- ③硫敵克安全採期為3天，陶斯松及第滅寧則為6天。

(謝進來 089-325110轉735)



95年度伴手產品金針槎、洛神槎、洛神酥、洛神酥。

(太麻里地區農會)



鳳梨防曬工作不可少

4月-8月為鳳梨果實發育中期及成熟期，這期間正值溫度高及日照長，在炎熱烈日之下，鳳梨果實常受到灼傷，甚或腐爛，影響品質與產量頗為深鉅，而防曬工作不可少，其方法：



- ①利用鳳梨果實周圍6-7枚下葉，用竹箴束縛在果實上面紮葉，或用紙絲放置在果實上，現在亦有使用紙袋在果實上面，及早作好防曬工作。
- ②防曬期間：春果在2-4月間，夏果5-6月間，秋、冬果7-9月間。