


颱風季節 請農友做好農業防災措施



瓜果菜類作物

1. 風雨後儘快採收成熟瓜果，唯未達農業安全用藥期之瓜果，不宜採收；排除田間積水，清除折損的莖蔓及葉片。
2. 風雨侵襲後，瓜類全面噴施58%「鋅錳滅達樂」可濕性粉劑400倍、74.1%「銅滅達樂」可濕性粉劑400倍、64%「鋅錳歐殺斯」可濕性粉劑500倍或50%「達滅芬」可濕性粉劑4,000倍液，以預防疫病(水傷)發生，噴施時應混合24.9%「待克利」乳劑3,000倍或25%「撲克拉」乳劑3,000倍，以同時預防葉片及果實的炭疽病；茄科作物如番茄、甜椒則可噴灑37.5%「氫氧化銅」水

懸劑400倍以預防細菌性斑點病。

3. 災後立即補施追肥，每分地施用尿素20公斤(或硫酸銨44公斤)及氯化鉀4公斤，以回復植株的生機。

葉菜類作物

1. 風雨後儘快採收成熟蔬菜，唯未達農業安全用藥期之蔬菜，不宜採收。
2. 風雨過後儘快排除田間積水，清除折損的莖蔓及葉片，並保持排水系統暢通。
3. 未達採收期的蔬菜，於風雨侵襲後，全面噴施25%「汰芬隆」水懸劑、30%「佈飛賽滅寧」乳劑1,000倍或其他政府推薦的藥劑防治斜紋夜盜蟲；結球白菜同時噴灑68.8%「多保

鏈黴素」可濕性粉劑1,000倍，以預防細菌性軟腐病；其他十字花科蔬菜噴灑81.3%「嘉賜銅」可濕性粉劑1,000倍，以預防黑腐病發生。

4. 災後立即補施追肥，每分地施用尿素20公斤(或硫酸銨44公斤)及氯化鉀4公斤，同時進行中耕培土。

各位農友如對預防農作物天然災害及災後復育有任何技術上的問題，歡迎與本場聯繫，必當竭誠提供技術諮詢服務。

(林永順089-325110轉700)

