

颱風季節

請農友做好農業防災措施

番荔枝

1. 注意颱風氣象預報，整修清理園間集、排水溝渠，保持水流的暢通，已達採收期的果實，儘快採收，未達農業安全用藥期之番荔枝果實不宜採收。
2. 風雨過後，傾斜或倒伏的植株不要勉強扶正，該在地上部立支柱固定，並在根際處順勢培土，以保護根系，同時適度修剪，倒伏嚴重的植株，可採用強剪(約剪除全株枝條的1/2-1/3量)，以減少水分蒸散以維持樹勢。
3. 強風導致植株嚴重落葉、折枝，容易造成雨後果實日燒傷害，應該以紙袋進行果實套袋。
4. 風雨過後病害最容易發生蔓延，立即剪除折枝、清除斷枝、落果，搬離園或集中埋入土中，隨即全園噴施50%「撲克拉錳」可濕性粉劑6,000倍或50%「貝芬同」可濕性粉劑750倍，以預防枝條的赤衣病及果實的黑腐病。
5. 酌量施少量三要素肥料以增強樹勢。

水稻

1. 整修清理田間或育苗場所集排水溝渠

，保持水流的暢通。

2. 風雨過後，儘快進行病蟲害的共同防治。
3. 災後稻田應補施少許氮鉀肥，以維持稻株的生長勢。

瓜果菜類作物

1. 風雨後儘快採收成熟瓜果，未達農業安全用藥期之瓜果，不宜採收；排除田間積水，清除折損的莖蔓及葉片。
2. 風雨侵襲後，瓜類全面噴施58%「鋅錳滅達樂」可濕性粉劑400倍、74.1%「銅滅達樂」可濕性粉劑400倍、64%「鋅錳歐殺斯」可濕性粉劑500倍或50%「達滅芬」可濕性粉劑4,000倍液，以預防疫病(水傷)發生，噴施時應混合24.9%「待克利」乳劑3,000倍或25%「撲克拉」乳劑3,000倍，以同時預防葉片及果實的炭疽病；茄科作物如番茄、甜椒則可噴灑37.5%「氫氧化銅」水懸劑400倍以預防細菌性斑點病。
3. 災後立即補施追肥，每分地施用尿素20公斤(或硫酸銨44公斤)及氯化鉀4公斤，以回復植株的生機。

葉菜類作物

1. 風雨後儘快採收成熟蔬菜，唯未達農業安全用藥期之蔬菜，不宜採收。
2. 風雨過後儘快排除田間積水，清除折損的莖蔓及葉片，並保持排水系統暢通。
3. 未達採收期的蔬菜，於風雨侵襲後，全面噴施25%「汰芬隆」水懸劑、30%「佈飛賽滅寧」乳劑1,000倍或其他政府推薦的藥劑防治斜紋夜盜蟲；結球白菜同時噴灑68.8%「多保鏈黴素」可濕性粉劑1,000倍，以預防細菌性軟腐病；其他十字花科蔬菜噴灑81.3%「嘉賜銅」可濕性粉劑1,000倍，以預防黑腐病發生。
4. 災後立即補施追肥，每分地施用尿素20公斤(或硫酸銨44公斤)及氯化鉀4公斤，同時進行中耕培土。

各位農友如對預防農作物天然災害及災後復育有任何技術上的問題，歡迎與本場(電話325110-700)聯繫，必當竭誠提供技術諮詢服務。

(農委會)