北部地區常見蔬菜栽培曆及病、蟲害防治曆

作物改良課副研究員李阿嬌、劉廣泉、助理研究員張簡秀容、台北分場副研究員許苑培、助理研究員顏勝雄、作物環境課副研究員施錫彬、助理研究員吳信郁、李宗翰、農業推廣課副研究員葉俊巖

北部地區的氣候特色是春季陰雨綿綿、夏季高溫炎熱、秋冬季東北季風強勁，各地區氣候又依地形（如都會區、山區或平原區等）而有些微差異；蔬菜爲短期作物，在作物別的選擇上應依各季節氣候及栽培處之地形不同而選擇適當作物及品種。作物栽培期間之肥培管理亦應就作物別及不同生長階段，依推薦量施用適當比例之肥料，切勿過度投入以避免造成土壤鹽害及理化性質劣化等情形發生；作物病蟲害防治上，除了消極性使用農業藥劑外，盡可能利用抗病蟲害品種及栽培技術（例如栽培時期、行株距等）防治，而使用農業藥劑時，應針對防治對象，確實遵守使用推薦的種類、濃度與時期，以及安全採收期等，以生產符合吉園圃標章之蔬菜。

本篇蔬菜栽培及病蟲害防治曆依北部地區概略之氣候特色推薦重要作物種類、依作物施肥手冊推薦合理施肥量及時期，並根據植物保護手冊及近期藥劑新增擴大使用方法與範圍之公告，摘錄部份推薦農業藥劑種類等，彙編如後，供栽培者參考，農友使用農業藥劑時，可根據主要病蟲害，選擇數種推薦藥劑輪流使用，以防病蟲抗藥性產生，農友進行經濟性栽培時，除了參考本栽培曆外，仍須考慮銷售管道、經營模式等因素，慎選栽種之作物別及品種。





成熟果的果梗木質化



北部地區蔬菜

作物	栽培型	播種（種植）期	播種量（公斤/公頃）	生育日數	生產期	適宜土壤
蕹菜	周年	1月至12月	撒播:60-80 條播:40-60 點播:30-40	25-30天	1月至12月	砂質、粘質壤土或腐植質壤土，pH 5.6-6.5
青蔥	周年	1月至12月	播種：2.5-3.0 分株繁殖:50萬株苗。	播種後約200-240天，分株繁殖約80-120天。	1月至12月	富有機質壤土或砂質壤土，pH 5.7-7.4
洋香瓜	春夏作	2月至6月	0.3-0.5	80-90天	5月至8月	排水良好的砂質壤土至黏質壤土，pH 6.0-6.8
胡瓜	春夏作	2月上旬至5月下旬	0.7-0.75	30-40天	3月至6月	富有機質之砂質壤土，pH 5.5-7.2
	秋播	8月中旬至9月下旬			9月至11月	
	高冷地	3月至7月			5月至9月	
番茄	高冷地	2月上旬至4月	0.3	50-70天	4月上旬至6月	砂質壤土至黏質壤土，pH 5.6-6.7
	秋播	8月上旬至10月			10月至12月	

栽培曆（1-12月）

行株距	主要栽培品種	施肥量（公斤/公頃）	肥料施用法
條播 點播 育苗移植 行距:20 公分 株距:15 公分	桃園一號、青骨大葉、白骨大葉、尖葉種、竹葉種。	堆肥:10,000 氮素:120-180 磷酐:50-90 氧化鉀:100-150	基肥:堆肥及磷肥 100%，氮肥及鉀肥各 1/3。 追肥: 氮肥、鉀肥 2/3 分兩次平均於播種後 10-12 天及 18-20 天施用。
畦寬 100 公分六行植，行距 20 公分、株距 20 公分。畦寬 130 公分六行植，行距 20 公分、株距 18 公分	北蔥：美秀、蘭陽 3 號等。 四季蔥：大廣蔥、粉蔥、宜蘭蔥、蘭陽 1 號、桃園 3 號、蘭陽 4 號、桃園 4 號等。	堆肥：20,000 氮素：240-275 磷酐：95-105 氧化鉀：90-120	基肥：堆肥 100%、氮肥 20%、磷肥 100%、鉀肥 25%。 追肥：氮肥 80%分四次施用、鉀肥 75%分三次施用。 第一次追肥於定植後 10 天施用，之後每隔 15～20 天追肥一次。
行距：2.0 公尺 株距：0.5 公尺	秋華、秋香、春香、新世紀、蜜世界、七股香。	堆肥：10,000 氮素：110-150 磷酐：210-250 氧化鉀：160-200	基肥:堆肥 100%、氮肥 20%、磷肥 50%、鉀肥 30%。 追肥：定植後每隔 10 天追肥一次，氮素 80%分四次（10%、30%、25%、15%），磷肥 50%分於第二、三次各 20%、30%，鉀肥 70%於二、三、四次施用，各 20%、30%、20%。
大胡瓜： 行距：70 公分 株距：40-50 公分 小胡瓜： 行距：70 公分 株距：35-40 公分	冬瓜青、瑞綠、清綠、中市 252、鳳燕、高砂、夏之輝、夏迪。 冬瓜青、雙頭齊、中市 252、吉利、鳳燕、夏迪、夏之輝。	堆肥：10,000 氮素：250-350 磷酐：120-180 氧化鉀：300-400	基肥：堆肥全量、氮肥 10%、磷肥 60%及鉀肥 20%。 追肥：氮肥 90%分五次施用（15%、15%、20%、20%、20%）。磷肥 40%施用於第一、二次各 20%、鉀肥 80%施用於第二、四次各 40%。
立支柱：畦寬 120 公分兩行植，行株距 60-75 公分 X45-50 公分	台中亞蔬四號、雙福、農友 301、桃園亞蔬 9 號、台中亞蔬 10 號、桃園亞蔬 20 號。 台中亞蔬四號、雙福、農友 301、桃園亞蔬 9 號、台中亞蔬 10 號、桃園亞蔬 10 號、花蓮亞蔬 5 號、桃太郎、神奇、大型福壽。	堆肥：10,000 氮素：200-250 磷酐：150-200 氧化鉀：120-180	基肥：堆肥、磷肥全部、氮肥 40%、鉀肥 25%。 追肥：氮肥 60%分四次，每 20～25 天施用 15%、鉀肥 75%分四次，定植後每隔 20～25 天施用 15%、20%、20%、20%。

作物	栽培型	播種（種植）期	播種量（公斤/公頃）	生育日數	生產期	適宜土壤
南瓜	春夏作	2月至6月		70-85天	5月至10月	排水良好的砂質壤土或壤土，pH 5.0-7.5
	北部地區	9月至10月			12月至3月	排水良好的砂質壤土或壤土，pH 5.0 -7.5
菜豆（敏豆）	春作	2月至4月	矮性品種 50 蔓性品種 30-40	開花後 25-35 天	5月至8月	排水良好之砂質壤土或壤土，pH 6.0-6.5
綠竹筍	春作	2月至4月	平地 500 欉 山坡地 300-350 欉	苗定植後 2-3 年	5月至9月	富含有機質且排水良好之砂質壤土，pH 5.6-7

行株距	主要栽培品種	施肥量（公斤/公頃）	肥料施用法
露地 行距：3 公尺 株距：1.5 公尺 網室 行距：1.5－2.5公尺 株距：0.8－1.0公尺	中國南瓜、鳳凰、仙姑。	堆肥：10,000 氮素：120-150 磷酐：90-100 氧化鉀：150-180	基肥：堆肥全部、氮肥、磷肥及鉀肥各施 40%。 追肥：氮肥、磷肥及鉀肥 60%分三次平均施用，於定植後每隔三週施用。
露地 行距：3 公尺 株距：1.5 公尺 網室 行距：1.5－2.5公尺 株距：0.8－1.0公尺	印度南瓜(西洋南瓜)、一品、東英、東昇、李白、ABSIU、MIYAKO、近成芳香。		
矮性品種： 行距：50 公分 株距：15–20 公分 蔓性品種： 行距：60 公分 株距：30–60 公分	農友早生、白雪、黑仁粉骨種、台中一號。	堆肥：5,000–10,000 氮素：90–120 磷酐：60–90 氧化鉀：100–120	基肥：堆肥及磷肥全量，氮肥 30%、鉀肥 50%。 追肥：第 1 次追肥於發芽後 15 天施用氮肥 30%，第 2 次追肥於發芽後 30 天施用氮肥 20%、鉀肥 25%，第 3 次追肥於發芽後 45 天施用氮肥 20%及鉀肥 25%。
行距：5 公尺 株距：4 公尺	尚無命名品種	新植林 堆肥：10–20 公斤/欉/年 氮素：500 公克/欉/年 磷酐：250 公克/欉/年 氧化鉀：400 公克/欉/年 成林(2 年以後) 堆肥：40–60 公斤/欉/年 氮素：600 公克/欉/年 磷酐：600 公克/欉/年 氧化鉀：600 公克/欉/年	新植林 基肥：於 1–3 月間施用，堆肥 100%，氮肥、磷肥及鉀肥各 50%。 追肥：氮肥、磷肥及鉀肥 50%，分別於春肥及夏肥各施 25%。 成林(2 年以後) 基肥：於 1–3 月間施用，堆肥 100%，氮肥、磷肥及鉀肥各 25%。 追肥：氮肥、磷肥及鉀肥 75%，分別於 4、6、8 月各施 25%。

作物	栽培型	播種（種植）期	播種量（公斤/公頃）	生育日數	生產期	適宜土壤
甜椒	高冷地	3月至4月	0.4-0.6	75-90天	6月至7月	土層深厚砂質壤土或壤土，pH 5.5-6.8
	春作	2月至4月				
	秋作	8月至10月				
西瓜	春作	3月至6月	0.2-0.3	大型西瓜：110-120天 小型西瓜：70-80天	5月至10月	宜選排水良好、灌溉方便，土層深厚之疏鬆土壤，pH 5.6-7.0
扁蒲	春作	3月至4月	0.8-1.2	開花後 7-14 天	4月至7月	排水良好的砂質壤土或腐植土，pH 6.0-7.5
苦瓜	春夏作	3月至6月	0.2-0.4	定植後 50-70 天	4月至6月	宜選排水良好之砂質壤土至粘質壤土，pH 5.5-6.5
萵苣	春夏播	3月至8月	0.3-0.4	30-35天	4月至10月中旬	富有機質的砂質壤土或黏質壤土，pH 6.0-6.3
	秋冬播	9月至12月			10月至2月	
不結球白菜	夏秋播	3月至11月	12	25-50天	4月至12月	砂質壤土至粘質壤土，pH 5.0-6.0
	冬春播	11月至12月			12月至3月	

行株距	主要栽培品種	施肥量（公斤/公頃）	肥料施用法
定植時矮性品種 行距：60 公分 株距：40 公分 其他品種 行距：65 公分 株距：45 公分	女王星、藍星、銘星。	堆肥：10,000-20,000 氮素：120-150 磷酐：120-150 氧化鉀：150-180	基肥：堆肥全量、氮肥 30%、磷肥 100%及鉀肥 50%。 追肥：氮肥 70%分三次於每隔 10－15 天 20%、25%、25%追施一次，鉀肥 50% 於二追時施用。
大型西瓜： 行距 2.1 公尺 株距 2.1 公尺 小型西瓜： 行距 3.6 公尺 株距 1.2 公尺	富寶二號、華寶、新龍、黑美人、金蘭、秀玲、新冠、珠蘭、華光、壽山、泰山、國光、鳳光、黑姑娘等。	堆肥：10,000 氮素：180-240 磷酐：120-240 氧化鉀：200-240	基肥：堆肥 100%、氮肥 10%、磷肥 60%、鉀肥 25%。 追肥：氮肥 90%分五次施用(10、15、20、25、20%)、磷肥 40%在二和三次追肥各施用 20%、鉀肥 75%在二、三、四次追肥施用(15、30、30%)。第一次追肥在定植存活後，第二次在本葉 5～6 片時，第三次在蔓長約 50 公分時，第四次在雌花始期，第五次在幼果如拳頭大時。
匍匐式栽培： 行距 5.4-6 公尺 株距 1.5-2.0 公尺 水平式栽培： 行距 4.8-5.4 公尺 株距 1.2-1.8 公尺	長型：牛腿蒲、目蒲、冬瓜蒲、高雄 1 號、永樂、長樂、永芳、永秀等。 圓型：酒矸匏、虎皮匏、花匏等。	堆肥：20,000 氮素：55 磷酐：55 氧化鉀：120	基肥：堆肥 100%。 追肥：氮肥、磷肥、鉀肥分四次施用(20、20、40、20)。第一次於定植後 8～10 天，第二次於摘心後施用，第三次於果實膨大期施用，第四次於果實開始採收時視植株生長情形施用。
匍地栽培： 行距 3-3.5 公尺 株距 1.5-1.8 公尺 棚架栽培： 行距 2-2.5 公尺 株距 1.5-1.8 公尺	綠色品種：綠人、秀華、翠華、月英等。 白色品種：高月、月美、永華、秀月、月華、玉英等。 小果品種：小月、花蓮 4 號等。	堆肥：10,000 氮素：250-350 磷酐：100-150 氧化鉀：150-300	基肥：堆肥 100%、氮肥 20%、磷肥 50%、鉀肥 50%。 追肥：氮肥 80%每隔 2 周施用一次，平均施用 7-8 次。50%磷肥及鉀肥於第二次及第三次追肥時平均施用。
直播苗 株距：6-7 公分 半結球萵苣育苗移植：20X20 公分	本地白萵、半結球萵苣、改良白萵、青萵。 皺葉萵苣、嫩莖萵苣、改良種白萵、本地白萵、結球萵苣。	堆肥：5,000 氮素：100－120 磷酐：50－100 氧化鉀：90－120	基肥：堆肥全部、磷肥全部、氮肥、鉀肥 50%。 追肥：氮肥、鉀肥 50%於本葉 3－4 枚時施用。
行距：10-15 公分 株距：10-15 公分	青梗白菜、鳳山白菜、鳳京白菜、東京白菜、油菜。	堆肥：10,000 氮素：150-180 磷酐：90-100 氧化鉀：110-150	基肥：堆肥及磷肥全部施用，氮肥及鉀肥各施 34%。 追肥：氮肥及鉀肥每 7 天各施 22%。
行距：10-15 公分 株距：10-15 公分	東京白菜、青梗白菜、鳳京白菜。		

作物	栽培型	播種（種植）期	播種量（公斤/公頃）	生育日數	生產期	適宜土壤
莧菜	春夏播	3月至8月	1.0-1.5	18-23天	4月至9月	排水良好之砂質壤土或壤土，pH 5.0-7.0
甘藍	北部地區春夏作	3月至6月	0.3-0.5	60-85 天	5月至9月	適應性廣，砂質壤土爲佳 pH 5.5-6.5
	北部地區秋冬作	8月至11月			10月至1月	適應性廣，砂質壤土爲佳，pH 5.5-6.5
	高冷地區	3月至5月			7月至8月	適應性廣，砂質壤土爲佳，pH 5.5-6.5
芥藍		4月至12月	5	30-45天	1月至12月	砂質壤土，pH 5.5-6.5
結球白菜	春夏作	4月至8月	0.8-1.0	40-65天	5月至9月	坋質壤土，pH 5.5-6.5
	秋冬作	9月至11月			11月至1月	
	高冷地	3月至6月			5月至7月	
豇豆(菜豆)	春夏播	4月至8月	8-10	60-70天	6月至10月	排水良好之砂質、粘質壤土，pH 6.2-7

行株距	主要栽培品種	施肥量（公斤/公頃）	肥料施用法
撒播留株距 5-6 公分 條播 行距：15-20 公分	特白莧、白莧、綠莧、紅莧、黃葉種、軟枝莧、金豐。	堆肥：10,000 氮素：100-120 磷酐：60-80 氧化鉀：100-120	基肥：堆肥及磷肥全量，氮肥及鉀肥 50%。 追肥：於播種後 10 天分別施用 50% 氮肥及鉀肥。
行距：60-75 公分 株距：40-50 公分	早秋、春秋 2 號、夏峰、高峰。	堆肥：10,000 氮素：秋冬作：250-350。夏作：200-300 磷酐：70-90 氧化鉀：120-180	基肥：堆肥及磷肥全部，氮肥及鉀肥各 34%。 追肥：氮肥及鉀肥定植後 10-15 天、20-30 天、30-45 天各施 22%。
行距：60-75 公分 株距：40-50 公分	初秋、春秋 1 號、春秋 2 號、高峰。		
行距：60-75 公分 株距：40-50 公分	初秋、春秋 1 號。		
行距：40-50 公分 株距：40-50 公分	採收幼株品種：平滑葉種、白花葉種、黃金嫩葉芥藍、皺葉芥藍。 採收成株及主側枝花苔品種：捲葉芥藍、黃花芥藍。	堆肥：12,000 氮素：300 磷酐：350 氧化鉀：200	基肥：堆肥、磷肥全部施用，、鉀肥及氮肥 60%。 追肥：氮肥及鉀肥 40%分兩次施用，每隔 10-15 天施用一次。
行距：50-70 公分 株距：35-50 公分	漳浦白菜、濱綠。	堆肥：10,000 氮素：200-250 磷酐：90-150 氧化鉀：120-180	基肥：堆肥及磷肥全部，氮肥及鉀肥各 34%。 追肥：氮肥及鉀肥定植後 15-20 天、30-35 天、45-50 天各施 22%。
行距：50-70 公分 株距：35-50 公分	天津白菜、山東白菜。		
行距：50-70 公分 株距：35-50 公分	天津白菜、翠玉白菜。		
行距：75 公分 株距：50 公分	三尺青皮、白皮白仁、白皮黑花仁、紅花仁長夾。	堆肥：10,000 氮素：60-120 磷酐：60-90 氧化鉀：90-120	基肥：堆肥及磷肥 100%，氮肥及鉀肥各 34%。 追肥：分別於發芽後 15-20 天；發芽後 35-40 天；發芽後 55-60 天，分三次施用氮肥及鉀肥各 22%。

作物	栽培型	播種（種植）期	播種量（公斤/公頃）	生育日數	生產期	適宜土壤
花椰菜	夏秋播	極早生種 6月至8月 早生種 7月至9月 中生種 8月至10月 晚生種 10月至12月	0.2-0.4	極早生種 40天 早生種 50天 中生種 60天 晚生種 80天	極早生種 7月至 10月 早生種 8月至 11月 中生種 10月至 12月 晚生種 1月至 3月	富含有機質之砂質、粘質壤土， pH 5.5-6.5
蘿蔔	夏播	6月 至 10月	5-6	50-80天	8月 至 12月	土層深厚、排水良好、富含有機質之砂質壤土或壤土， pH 5.6-6.8
	秋冬播	8月 至 1月			1月 至 4月	
胡蘿蔔	秋冬播	7月 至 1月	條播 2.5-3 撒播 4.5	100-120天	12月 至 4月	表土深厚、排水良好之沖積砂土或砂質壤土， pH 6.0-6.6
芹菜	周年	8月 至 翌年3月	2-3	本地芹：秋冬季在播種後100天，夏季70天。 西洋芹：播種後100天	周年	排水良好且富有機質之壤土。 pH 5.6-6.8
青花菜	秋冬作	8月 至 2月	0.4-0.7	定植後 早生種：50-60天 中生種：70-90天 晚生種： 100-120天	10月 至 4月	排水良好之砂土至黏質壤土， pH 5.5-8.0

行株距	主要栽培品種	施肥量（公斤/公頃）	肥料施用法
極早生種 行距：60 公分 株距：45 公分 早生種 行距：75 公分 株距：50 公分 中生種 行距：80 公分 株距：55 公分 晚生種 行距：80 公分 株距：60 公分	早生品種： 鳳山極早生、楠梓極早生 40 天、農友極早生。 中生品種： 鳳山中生、楠梓青莖 50 天 2 號、農友嬌雪。 晚生品種： 鳳山晚生、80 天青梗、農友雪姬。	堆肥：10,000-20,000 極早生種 氮素：180-220 磷酐：70-130 氧化鉀：130-190 早生種 氮素：220-260 磷酐：90-150 氧化鉀：150-210 中生種及晚生種 氮素： 250-300 磷酐：110-170 氧化鉀：180-230	極早生種及早生種 基肥：堆肥及磷肥 100%，氮肥 40%、鉀肥 50%。 追肥：氮肥 60%分三次(15%、25%、20%)施用，鉀肥 50%於二追時施用。一追於定植後 7-10 天施用，之後每隔 10-14 天施用一次。 中生種及晚生種 基肥：堆肥及磷肥 100%，氮肥 30%、鉀肥 50%。 追肥：氮肥 70%分四次(10%、15%、25%、20%)施用，鉀肥 50%於二追時施用。一追於定植後 7-10 天施用，之後每隔 10-14 天施用一次。
行距：45-50 公分 株距：20-25 公分	早矸仔、60 日矸仔、大白朴、矸仔朴、夏豐。 大梅花、梅花矸、晚生大梅花、早春 3 號、東山大根。	堆肥：10,000-20,000 氮素：140-160 磷酐：80-100 氧化鉀：110-130 硼砂：2-6(缺硼土壤施用)	基肥：堆肥及磷肥 100%，氮肥 40%、鉀肥 60%。 追肥：氮肥 60%分三次(15%、20%、25%)，鉀肥 40%分兩次於第一、二次追肥各半施用。一追於發芽後 6-10 天施用，之後每隔 10-14 天追施一次。
行距：25 公分 株距：20 公分	新黑田五寸、五寸、向陽 2 號、理想。	堆肥：10,000 氮素：220 磷酐：125 氧化鉀：220	基肥：堆肥 100%，氮肥 18%，磷肥 64%，鉀肥 9%。 追肥：發芽後 15 天施用氮肥 18%，磷肥 8%，鉀肥 9%；發芽後 30 天施用氮肥 36%，磷肥 16%，鉀肥 27%；發芽後 50 天施用氮肥 18%，磷肥 8%，鉀肥 28%；發芽後 70 天施用氮肥 10%，磷肥 4%，鉀肥 27%。
本地芹 行距：12-20公分 株距：12-15公分 西洋芹： 行距：25公分 株距：25公分	本地芹： 黃心芹、海南青(綠種)、青葉白骨、青筒及夏芹 西洋芹： 綠色及黃色兩種	堆肥：20,000 氮素：150-230 磷酐：60-90 氧化鉀：150-180	基肥：堆肥 100%、氮素 35%、磷酐 100%、氧化鉀 30%。 追肥：氮素65%分二次施用(35%、30%)、氧化鉀65%，
行距：60 公分 株距：45-50 公分	清華、綠王、綠輝、綠寶、慶農 75 天。	堆肥：10,000-20,000 氮素：190-230 磷酐：90-110 氧化鉀：150-210	基肥：堆肥全量，氮肥 45%、磷肥 70%及鉀肥 60%。 追肥：第 1 次追肥於定植成活後施用氮肥 15%及鉀肥 15%，8-10 天後第 2 次追肥施用氮肥 15%、磷肥 30%及鉀肥 25%，再隔 8-10 天第 3 次追肥施用氮肥 25%。

作物	栽培型	播種（種植）期	播種量（公斤/公頃）	生育日數	生產期	適宜土壤
茼蒿	秋冬播	9月上旬至2月上旬	12-18	25-35天	10月至3月上旬	砂質壤土或黏質壤土，pH 5.5-6.8
菠菜	秋冬播	9月至5月	早秋或晚春50 冬播30	50-60天	10月至6月	保水保肥力佳及通氣良好之砂質壤土至黏質壤土，pH 6.5-7.5
芥菜	秋冬作	9月至12月	28,000-31,000株	葉用芥菜播種後40-60天，鹽漬加工葉用爲播種後75天。	10月至翌年3月	宜選排水良好、灌溉方便，土層深厚，富有機質之砂質或黏質壤土，pH 5.5-6.8
青蒜	秋冬作	9月下旬至11月上旬	1,400-1,500	播種後80-100天	10月下旬至3月下旬	富有機質壤土或砂質壤土，pH 5.6-6.0
絲瓜	春作	12月下旬至3月中旬	1.6	100-120天	3月至7月	宜選保水力佳、灌溉方便，富有機質之砂質壤土或壤土，pH 5.8-6.8
韭菜	周年	11月至12月	4.5-6	播種定植後70-80天。分株定植後50天	周年	排水良好且富有機質之壤土。pH 5.6-6.5

行株距	主要栽培品種	施肥量（公斤/公頃）	肥料施用法
莖苗長約 3 公分時，間拔留行株距 12X12 公分	虎耳大葉（圓葉種） 匙葉（匙葉種）	堆肥：10,000 氮素：140-150 磷酐：90-110 氧化鉀：100-140	基肥：堆肥全部、磷肥全部、氮肥、鉀肥 50%。 追肥：氮肥、鉀肥 50%於萌芽後 15-20 天施用。
條播行距：15-20 公分 撒播留株距 6-7 公分	西螺一號、西螺大葉、清風、綠湖、梨山菠菜。	堆肥：20,000 氮素：150-180 磷酐：90-120 氧化鉀：120-150	基肥：堆肥及磷肥全量，氮肥及鉀肥 25%。 追肥：氮肥及鉀肥於發芽後 7-10 天、14-15 天及 15-30 天分別施用 25%。
整地栽培：畦寬 130 公分二行植，株距 45-60 公分。 不整地栽培：在二期水稻收割後，每隔 4 株稻椿開一直溝做畦溝，每畦二行植，株距 45-60 公分。	莖用芥菜：大心芥菜、四川榨菜等。 葉用芥菜：竹仔芥、粉甲、雞冠、扁甲、圓甲、肉甲、捲心、桃園 1 號、雪裡紅等。	大芥菜 堆肥：10,000-20,000 氮素：180-240 磷酐：90-120 氧化鉀：150-180 小芥菜 堆肥：10,000 氮素：90-120 磷酐：45-60 氧化鉀：75-90	大芥菜 基肥：堆肥 100%、氮肥 34%、磷肥 100%、鉀肥 34%。 追肥：氮肥 66%、鉀肥 75%分三次施用。 小芥菜 基肥：堆肥、氮肥、磷肥、鉀肥 100%
畦寬 120 公分四行植，行距 20 公分、株距 10 公分。 畦寬 150 公分六行植，行距 25 公分、株距 10 公分。 畦寬 200 公分，短柵行距 10 公分、株距 10 公分。	大片黑、西港蒲蒜、西螺白蒜、宜蘭白蒜、北蒜等。	堆肥：10,000 氮素：220 磷酐：125 氧化鉀：150	基肥：堆肥 100%、氮肥 18%、磷肥 64%、鉀肥 13%。 追肥：氮肥 82%分三次施用(27、36、19%)、磷肥 36%分三次施用(12、16、8%)、鉀肥 87%分三次施用(20、40、27)。分別於定植後 30、60、90 天施用。
匍匐式栽培： 行距 3.0 公尺、株距 1.0 公尺。 隧道式栽培： 行距 3.0 公尺、 株距 0.9-1.2 公尺。 水平式栽培： 行距 2.5 公尺、 株距 1.2 公尺。	長筒絲瓜：農友 132、美人、東光、七美、七星、東光 3 號、高雄 2 號。 稜角絲瓜：長安、平安、三喜、美菱等。	堆肥：10,000-20,000 氮素：95-115 磷酐：90-105 氧化鉀：130-170	基肥：堆肥 100%、磷肥 100% 追肥：氮肥 100%、鉀肥 100%分五次施用。第一次追肥於移植後 10 天或直播後本葉 2-3 枚時，第二次於抽蔓時條施並培土，第三次於蔓長 60 公分時，第四次於子蔓開第一朵雌花時，第五次於著小果時。
行距：27公分 株距：24公分	小葉種 大葉種 呂宋種	堆肥：20,000 氮素：80-150 磷酐：30-50 氧化鉀：60-80	基肥：堆肥 100%、氮素 50%、磷酐50%、氧化鉀50% 追肥：氮素50%、磷酐50%及氧化鉀50%分二次施用。

作物	栽培型	播種（種植）期	播種量（公斤/公頃）	生育日數	生產期	適宜土壤
葉用甘藷	春夏作	北部地區 3月 至 7月 中南部地區 3月 至 8月	160,000株	180-240天（可採收10-14次）	北部地區 3月 至 9月 中南部地區 3月 至 10月	排水良好且富含有機質之壤土、砂質壤土、粘質壤土爲佳，pH 5.2-6.7。
茭白	春作 (單季茭)	3月 至 5月	10,000株	定植後 早生種： 210-230天 晚生種： 230-250天	9月 至 11月	水源豐富、排水良好且富含有機質之粘質壤土爲佳，pH 5.5-6.5
草莓	夏季穴植管育苗	11月中旬自本圃選健壯株所長之幼蔓，以小型塑膠缽盛接育苗，約30天後切離母株集中管理，翌年2月中旬再種植於7.5吋大花缽放置於床架上管理。			幼蔓誘植自5月中旬至8月上旬爲止	勿採用田土，以防感染病蟲害，採乾淨質輕之介質爲宜
	秋冬春作	9月下旬-10月上旬之間	45,000-50,000株	定植後約30-40天	11月至4月	宜選土層深厚、富含有機質、排水通氣良好的砂質壤土，pH5.7-6.5
芋	旱芋	子芋品種 2月-4月 母芋品種 12月-翌年3月	子芋品種27,700株，母芋品種28,500株	9-11個月	子芋品種 11月-3月 母芋品種 9月-2月	土層深厚、富含有機質、保水力強之壤土，粘質壤土適合採收母芋栽培，砂質壤土適合採收子芋栽培。pH 5.5-7.0
	水芋	母芋品種 1月-3月		8-10個月	母芋品種 4月-12月	

行株距	主要栽培品種	施肥量（公斤/公頃）	肥料施用法
行距：25公分 株距：25公分	桃園二號	堆肥：10,000 氮素：90-120 磷酐：30-60 氧化鉀：160-200	基肥：堆肥100%、氮肥20%、磷肥100%、鉀肥50%。 追肥：一追於定植後1個月施用氮肥20%、鉀肥50%，二追於定植後3個月施用氮肥20%，三追於定植後5個月施用氮肥20%，四追於定植後7個月施用氮肥20%。
行距：1公尺 株距：1公尺	桃園一號 (赤殼早生種)、 桃園二號 (赤殼晚生種)。	堆肥：15,000 氮素：200-250 磷酐：100-140 氧化鉀：100-200	基肥：堆肥全量、磷肥75%。 追肥：一追於定植後10-15天施用氮肥15%、鉀肥60%，二追於定植後20-25天施用氮肥25%、磷肥25%，三追俟孕蕊期再施用氮肥25%、鉀肥40%，四追於採收期分1-2次施用氮肥35%。
	桃園一號、 桃園三號		以緩效性肥料補充親株養分，誘植期間以葉面施肥方式供給穴植管苗營養，8月中旬再施緩效性肥料一次即可。
畦寬120公分二行植，行距27-30公分，株距25-30公分。		堆肥：5,000-9,000 氮素：150-200 磷酐：150-200 氧化鉀：150-200	基肥：堆肥100%、氮肥65%、磷肥65%、鉀肥65%。 追肥：氮肥、磷肥、鉀肥於定植後30-40天花蕾著生時分別施用35%。
子芋品種 行株距：60x60公分 母芋品種 行株距：70x50公分	子芋品種： 赤芽芋、狗蹄芋、高雄2號。 母芋品種： 檳榔心芋、高雄1號、麵芋、紅梗芋。	堆肥:20,000 氮素:400 磷酐:200 氧化鉀:450	基肥:堆肥100%，氮素16%、磷酐40%、氧化鉀16%。 追肥:於定植後每隔一個月追施一次，分6次施用，每次施氮素14%、磷酐10%、氧化鉀14%。
	母芋品種： 檳榔心芋、高雄1號、麵芋、紅梗芋。	堆肥:20,000 氮素:700 磷酐:200 氧化鉀:450	