蔬菜病害防治曆

作 物	主要病害	藥 劑	稀釋倍數(倍)	安全採收(天)
蘿菜	白銹病	80%福賽得水分散性粒劑	500	12
蔥	銹病	28%亞托環克座水懸劑	3,000	10
		50%三氟敏水分散性粒劑	4,000	12
		23%三泰隆水分散性粒劑	2,000	15
	紫斑病	23%亞托敏水懸劑	3,000	10
		44.2%克收欣水懸劑	2,500	10
		50%依普同可濕性粉劑	1,000	6
	白絹病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	12
		50%大克爛可濕性粉劑	2,000	12
		50%福多寧可濕性粉劑	3,000	18
洋香瓜	苗立枯病	30%殺紋寧溶液	1,000	
	白粉病	40%克熱淨可濕性粉劑	1,500	6
		19%平克座水基乳劑	7,500	6
		21.2%依滅列乳劑	2,000	3
	蔓枯病	23%亞托敏水懸劑	4,000	6
		37%護矽得乳劑	10,000	6
		24.9%待克利乳劑	3,000	6
	露菌病	23.6%百克敏乳劑	3,000	12
		9.4%賽座滅水懸劑	3,000	6
		80%免得爛水分散性粒劑	500	6
胡瓜	苗立枯病	30%殺紋寧溶液	1,000	
	露菌病	75%鋅錳座賽胺水分散性粒劑	1,000	3
		23%亞托敏水懸劑	2,000	6
		64%甲鋅歐殺斯可濕性粉劑	400	6
		58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑	400	7
	白粉病	99%礦物油乳劑	500	
		10.5%平克座乳劑	3,000	3
		13.4%邁克尼乳劑	4,000	3
	疫病	25%依得利乳劑	1,500	6
		35%依得利可濕性粉劑	2,000	6
		50%達滅芬可濕性粉劑	3,000	6
	炭疽病	70%四氯保淨可濕性粉劑	500	6
	細菌性斑點病	40%銅快得寧混合可濕性粉劑	500	3
番茄	苗立枯病	5%本達樂粒劑	0.02 公克/穴	
	晚疫病	9.4%賽座滅水懸劑	3,000	6
		80%免得爛可濕性粉劑	500	7
		50%達滅芬可濕性粉劑	4,000	6

作 物	主要病害	藥 劑	稀釋倍數(倍)	安全採收(天)
番茄	晚疫病	52.5%凡殺克絕水分散性粒劑	2,500	6
	早疫病	58%松香酯銅乳劑	1,500	
		77%氫氧化銅可濕性粉劑	800	6
		81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	1,000	3
	葉黴病	80%錳乃浦可濕性粉劑	400	7
		80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	500	7
	幼苗疫病	25%依得利乳劑	1,500	限苗期使用
		35%依得利可濕性粉劑	3,000	限苗期使用
	白絹病	50%福多寧可濕性粉劑	5,000	
	細菌性斑點病	53.8%氫氧化銅水分散性粒劑	2,000	6
		81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	1,000	6
		27.12%三元硫酸銅水懸劑	500	3
	炭疽病	22.7%腈硫醌水懸劑	700	4
	灰黴病	23.7%依普同水懸劑	1,000	6
		50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	6
南瓜	露菌病	55%腈硫醌銅可濕性粉劑	500	7
		23%亞托敏水懸劑	2,000	6
		64%甲鋅歐殺斯可濕性粉劑	400	6
		58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑	400	7
	白粉病	11.76%芬瑞莫乳劑	10,000	3
		13.4%邁克尼乳劑	4,000	3
		5%三泰芬可濕性粉劑	2,000	6
	炭疽病	70%四氯保淨可濕性粉劑	500	6
菜豆(敏豆)	白粉病	50%枯草桿菌可濕性粉劑	800	
		5%三泰隆可濕性粉劑	2,000	3
		10.5%平克座乳劑	4,000	6
	銹病	38%白列克敏水分散性粒劑	1,500	9
		33%鋅錳乃浦水懸劑	400	12
	角斑病	24.9%待克利乳劑	3,000	3
綠竹筍	嵌紋病	砍除罹病株並更新無病毒綠竹苗		
甜椒	疫病	5%本達樂粒劑	0.02 公克/穴	
		25%依得利乳劑	2,500	20
		35%依得利可濕性粉劑	2,000	20
	細菌性斑點病	81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	1,000	3
		27.12%三元硫酸銅水懸劑	500	3
	炭疽病	22.7%腈硫醌水懸劑	700	4
		23.6%百克敏乳劑	3,000	6
	灰黴病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	6

作 物	主要病害	藥 劑	稀釋倍數(倍)	安全採收(天)
西瓜	苗立枯病	30%殺紋寧溶液	1,000	
	白粉病	5%三泰隆可濕性粉劑	2,000	6
		30%白粉松乳劑	2,000	3
		11.76%芬瑞莫乳劑	4,000	3
	蔓割病	74%貝芬錳可濕性粉劑	400	6
	蔓枯病	23%亞托敏水懸劑	4,000	6
		21.2%依滅列乳劑	2,000	3
		50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	15
	露菌病	27.12%三元硫酸銅水懸劑	800	3
		60%銅合腐絕可濕性粉劑	500	3
		37%銅本達樂可濕性粉劑	600	6
		93%克絕波爾多可濕性粉劑	600	3
	炭疽病	25%撲克拉水基乳劑	3,000	6
		24.9%待克利乳劑	3,000	9
		75%四氯異苯腈可濕性粉劑	600	14
	根瘤線蟲	75%福賽絕乳劑	600-1,000	限種植當日施藥
		10%芬滅松粒劑	15 公斤/公頃	限種植當日施藥
		10%托福松粒劑	15 公斤/公頃	限種植當日施藥
扁蒲	露菌病	55%腈硫醌銅可濕性粉劑	500	7
		23%亞托敏水懸劑	2,000	6
		64%甲鋅歐殺斯可濕性粉劑	400	6
		58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑	400	7
	白粉病	11.76%芬瑞莫乳劑	10,000	3
		13.4%邁克尼乳劑	4,000	3
		5%三泰芬可濕性粉劑	2,000	6
	炭疽病	70%四氯保淨可濕性粉劑	500	6
苦瓜	苗立枯病	30%殺紋寧溶液	1,000	
	露菌病	55%腈硫醌銅可濕性粉劑	500	7
		64%甲基歐殺斯可濕性粉劑	400	6
		80%錳乃浦可濕性粉劑	400	7
		75%免得克絕可濕性粉劑	750	3
	炭疽病	70%四氯保淨可濕性粉劑	500	6
萬苣	苗立枯病	50%福多寧可濕性粉劑	2,000	限苗期使用
	露菌病	50%達滅芬可濕性粉劑	3,000	6
		23%亞托敏水懸劑	2,000	12
		48%松香酯銅乳劑	1,000	
	黑斑病	21.2%依滅列乳劑	1,500	6
		75%四氯異苯腈可濕性粉劑	700	7
		50%依普同可濕性粉劑	1,000	6

作 物	主要病害	藥 劑	稀釋倍數(倍)	安全採收(天)
萵苣	葉枯病（葉斑病）	21.2%依滅列乳劑	1,500	12
		23%三泰隆水分散性粒劑	2,000	15
	菌核病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	7
		50%大克爛可濕性粉劑	2,000	7
		50%貝芬同可濕性粉劑	1,000	6
白菜	苗立枯病	23.2%賓克隆水懸劑	1,000	15
		50%福多寧可濕性粉劑	2,000	限苗期使用
	露菌病	48%快得克絕可濕性粉劑	750	15
		23%亞托敏水懸劑	2,000	15
	黑斑病	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	700	7
		21.2%依滅列乳劑	1,500	6
莧菜	白銹病	33.5%快得寧水懸劑	1,500	15
		80%福賽得水分散性粒劑	500	12
		64%甲鋅歐殺斯可濕性粉劑	400	15
甘藍	苗立枯病	23.2%賓克隆水懸劑	1,000	15
	露菌病	71.6%銅右滅達樂可濕性粉劑	600	3
		48%快得克絕可濕性粉劑	750	15
		23%亞托敏水懸劑	2,000	15
	黑斑病	10%保粒黴素（甲）可濕性粉劑	1,000	
		21.2%依滅列乳劑	1,500	12
	黑腐病	10%維利黴素溶液	600	6
		81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	1,000	6
	細菌性軟腐病	12.5%鏈黴素溶液	1,000	
		16.5%鏈土黴素可濕性粉劑	500	
	菌核病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	7
	根瘤病	0.3%氟硫滅粉劑	每公頃每次施藥量 200 公斤	
芥藍	苗立枯病	23.2%賓克隆水懸劑	1,000	15
	露菌病	23%亞托敏水懸劑	2,000	15
		48%松香酯銅乳劑	1,000	
	黑斑病	10%保粒黴素（甲）可濕性粉劑	1,000	
		21.2%依滅列乳劑	1,500	12
結球白菜	苗立枯病	23.2%賓克隆水懸劑	1,000	15
	露菌病	71.6%銅右滅達樂可濕性粉劑	600	3
		48%快得克絕可濕性粉劑	750	15
		23%亞托敏水懸劑	2,000	15
	黑斑病	21.2%依滅列乳劑	1,500	12
	軟腐病	68.8%多保鏈黴素可濕性粉劑	1,000	12
		12.5%鏈黴素溶液	1,000	

作 物	主要病害	藥 劑	稀釋倍數(倍)	安全採收(天)
結球白菜	軟腐病	16.5%鏈土黴素可濕性粉劑	500	
	菌核病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	7
	根瘤病	0.3%氟硫滅粉劑	每公頃每次施藥量 200 公斤	
菜豆(豇豆)	白粉病	24.9%待克利乳劑	3,000	3
		5%三泰隆可濕性粉劑	2,000	3
		10.5%平克座乳劑	4,000	6
	銹病	33%鋅錳乃浦水懸劑	400	12
		38%白列克敏水分散性粒劑	1,500	9
	煤黴病	24.9%待克利乳劑	3,000	3
		5%三泰隆可濕性粉劑	2,000	3
花椰菜	苗立枯病	23.2%賓克隆水懸劑	1,000	15
	露菌病	71.6%銅右滅達樂可濕性粉劑	600	3
		48%松香酯銅乳劑	1,000	
	黑斑病	21.2%依滅列乳劑	1,500	12
	細菌性軟腐病	12.5%鏈黴素溶液	1,000	
		16.5%鏈土黴素可濕性粉劑	500	
	菌核病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	7
蘿蔔	苗立枯病	23.2%賓克隆水懸劑	1,000	15
	露菌病	71.6%銅右滅達樂可濕性粉劑	600	3
		48%快得克絕可濕性粉劑	750	15
		23%亞托敏水懸劑	2,000	15
胡蘿蔔	白粉病	50%克收欣水分散性粒劑	3,000	3
		5%三泰隆可濕性粉劑	2,000	12
		18.6%賽福寧乳劑	1,000	21
	根瘤線蟲	10%芬滅松粒劑	20-40 公斤/公頃	限播種前使用
		5%丁基加保扶粒劑	70 公斤/公頃	限播種前使用
		3%加保扶粒劑	100 公斤/公頃	限播種前使用
芹菜	黃萎病	98%邁隆粒劑	60 公克/平方公尺	限苗圃使用
	葉枯病	47%氧化亞銅水懸劑	800	7
青花菜	苗立枯病	23.2%賓克隆水懸劑	1,000	15
	露菌病	71.6%銅右滅達樂可濕性粉劑	600	3
		48%松香酯銅乳劑	1,000	
	黑斑病	21.2%依滅列乳劑	1,500	12
	細菌性軟腐病	12.5%鏈黴素溶液	1,000	
		16.5%鏈土黴素可濕性粉劑	500	
	菌核病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	7

作 物	主要病害	藥 劑	稀釋倍數(倍)	安全採收(天)
茼蒿	立枯病	50%福多寧可濕性粉劑	2,000	限苗期使用
	葉枯病	21.2%依滅列乳劑	1,500	12
		23%三泰隆水分散性粒劑	2,000	15
	露菌病	23%亞托敏水懸劑	2,000	15
		48%松香酯銅乳劑	1,000	
	菌核病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	7
		50%大克爛可濕性粉劑	2,000	7
		50%貝芬同可濕性粉劑	1,000	6
菠菜	苗立枯病	75%滅普寧可濕性粉劑	1,500	限苗床使用
		75%滅普寧可濕性粉劑	2 公克/公斤種子	限拌種使用
		50%福多寧可濕性粉劑	2,000	限苗期使用
	露菌病	70%鋅錳賽得可濕性粉劑	600	18
		23%亞托敏水懸劑	2,000	15
		48%松香酯銅乳劑	1,000	
芥菜	苗立枯病	23.2%賓克隆水懸劑	1,000	15
	露菌病	71.6%銅右滅達樂可濕性粉劑	600	3
		48%松香酯銅乳劑	1,000	
	黑斑病	21.2%依滅列乳劑	1,500	12
	細菌性軟腐病	12.5%鏈黴素溶液	1,000	
		16.5%鏈土黴素可濕性粉劑	500	
	菌核病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2,000	7
蒜	紫斑病	24.9%待克利乳劑	3,000	21
		81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	800	6
絲瓜	露菌病	55%腈硫醌銅可濕性粉劑	500	7
		23%亞托敏水懸劑	2,000	6
		64%甲鋅歐殺斯可濕性粉劑	400	6
		58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑	400	7
	白粉病	11.76%芬瑞莫乳劑	10,000	3
		13.4%邁克尼乳劑	4,000	3
		5%三泰芬可濕性粉劑	2,000	6
	疫病	25%依得利乳劑	1,500	6
		35%依得利可濕性粉劑	2,000	6
	炭疽病	70%四氯保淨可濕性粉劑	500	6
	細菌性斑點病	40%銅快得寧混合可濕性粉劑	500	3
韭菜	銹病	23.6%百克敏乳劑	2,500	15
		5%菲克利水懸劑	1,500	9

作 物	主要病害	藥 劑	稀釋倍數(倍)	安全採收(天)
茭白筍	銹病	5%菲克利水懸劑	2,000	6
	胡麻葉枯病	23.7%依普同水懸劑	1,000	6
草莓	葉芽線蟲	40%芬滅松乳劑	3,000	限浸苗使用
	炭疽病	53%腐絕快得寧可濕性粉劑	1,200	5
		24.9%待克利乳劑	3,000	5
	白粉病	25%布瑞莫乳劑	3,000	3
		50%克收欣水性分散性粒劑	3,000	3
		80%碳酸氫鉀水溶性粉劑	1,000	
	灰黴病	62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑	2,000	5
		50%白克列水分散性粒劑	1,500	5
		40%滅派林水懸劑	3,000	7
		23.7%依普同水懸劑	1,000	3
		50%免克寧水分散性粒劑	1,500	3
	果腐病	52.5%凡殺克絕水分散性粒劑劑	2,500	3
		70%免得克寧可濕性粉劑	500	7
芋頭	白絹病	75%滅普寧可濕性粉劑	1,000	21
	疫病	81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	1,000	6
		27.12%三元硫酸銅水懸劑	800	3



草莓白粉病



草莓白粉病



草莓灰黴病



草莓灰黴病



草莓葉芽線蟲



草莓青枯病


蔥銹病


十字花科根瘤病


瓜苗立枯病


十字花科黑斑病


甘藍菌核病


甘藷縮芽病


茄疫病


番茄青枯病


甘藍黑腐病


長豇豆煤黴病


番茄細菌性斑點病


番茄黃化捲葉病毒


胡瓜白粉病


甜椒炭疽病


番茄晚疫病


番茄葉黴病


莧菜白銹病


番茄早疫病


葉菜甘藷白銹病


萵苣萎凋病