# 果樹蟲害防治曆

## 柑桔蟲害防治曆

| 時 間 | 主要蟲害 | 藥 劑 | 稀釋倍數(倍) | 安全採收期(天) |
|---|---|---|---|---|
| 1至3月 | 柑桔葉蟎、銹蟎 | 20%畢達本可濕性粉劑 | 3,000 | 6 |
| | | 50%芬佈賜可濕性粉劑 | 2,000 | 60 |
| | | 95%礦物油乳劑 | 95 | |
| | | 5%芬普蟎水懸劑 | 1,000 | 21 |
| | 薊馬 | 48.34%丁基加保扶乳劑 | 1,000 | 21 |
| | 柑桔木蝨、刺粉蝨 | 44%大滅松乳劑 | 1,000 | |
| | | 50%馬拉松乳劑 | 800 | 4 |
| | | 40.64%加保扶水懸劑 | 1,200 | 7 |
| | 蚜蟲 | 44%大滅松乳劑 | 1,000 | |
| | | 50%馬拉松乳劑 | 800 | 4 |
| | | 40%丁基加保扶可濕性粉劑 | 1,200 | 20 |
| | | 40.64%加保扶水懸劑 | 1,200 | 10 |
| | 介殼蟲 | 50%馬拉松乳劑 | 800 | 4 |
| | | 44%大滅松乳劑 | 1,000 | |
| | | 95%礦物油乳劑 | 95 | |
| | | 31.6%丁基加保扶乳劑 | 400 | 21 |
| 4至6月 | 柑桔葉蟎、銹蟎 | 20%畢達本可濕性粉劑 | 3,000 | 6 |
| | | 50%芬佈賜可濕性粉劑 | 2,000 | 60 |
| | | 95%礦物油乳劑 | 95 | |
| | | 5%芬普蟎水懸劑 | 1,000 | 21 |
| | 薊馬 | 48.34%丁基加保扶乳劑 | 1,000 | 21 |
| | 椿象類 | 50%加保利可濕性粉劑 | 500 | |
| | | 44%大滅松乳劑 | 1,000 | |
| | 柑桔木蝨、刺粉蝨 | 44%大滅松乳劑 | 1,000 | |
| | | 40.64%加保扶水懸劑 | 1,200 | 7 |
| | | 50%馬拉松乳劑 | 800 | 4 |
| | 蚜蟲 | 44%大滅松乳劑 | 1,000 | |
| | | 50%馬拉松乳劑 | 800 | 4 |
| | | 40%丁基加保扶可濕性粉劑 | 1,200 | 20 |
| | | 40.64%加保扶水懸劑 | 1,200 | 10 |
| | 介殼蟲 | 50%馬拉松乳劑 | 800 | 4 |
| | | 44%大滅松乳劑 | 1,000 | |
| | | 95%礦物油乳劑 | 95 | |
| | | 31.6%丁基加保扶乳劑 | 400 | 21 |
| | 柑桔潛葉蛾 | 2.5%賽洛寧微乳劑 | 4,000 | 14 |
| | | 2.5%芬諾克可濕性粉劑 | 2,000 | 12 |
| | | 50%馬拉松乳劑 | 800 | 4 |
| | | 25%芬諾克可濕性粉劑 | 2,000 | 12 |

| 時 間 | 主要蟲害 | 藥 劑 | 稀釋倍數(倍) | 安全採收期(天) |
|---|---|---|---|---|
| 4至6月 | 柑桔潛葉蛾 | 30%福隆納乃得水懸劑 | 1,500 | 20 |
| | 星天牛 | 40.64%加保扶水懸劑 | 100 | 10 |
| 7至9月 | 柑桔葉蟎、銹蟎 | 20%畢達本可濕性粉劑 | 3,000 | 6 |
| | | 50%芬佈賜可濕性粉劑 | 2,000 | 60 |
| | | 95%礦物油乳劑 | 95 | |
| | | 5%芬普蟎水懸劑 | 1,000 | 21 |
| | 薊馬 | 48.34%丁基加保扶乳劑 | 1,000 | 21 |
| | 椿象類 | 50%加保利可濕性粉劑 | 500 | |
| | | 44%大滅松乳劑 | 1,000 | |
| | 柑桔木蝨、刺粉蝨 | 44%大滅松乳劑 | 1,000 | |
| | | 40.64%加保扶水懸劑 | 1,200 | 7 |
| | | 50%馬拉松乳劑 | 800 | 4 |
| | 蚜蟲 | 50%馬拉松乳劑 | 800 | 4 |
| | | 40%丁基加保扶可濕性粉劑 | 1,200 | 20 |
| | | 40.64%加保扶水懸劑 | 1,200 | 10 |
| | 介殼蟲 | 50%馬拉松乳劑 | 800 | 4 |
| | | 44%大滅松乳劑 | 1,000 | |
| | | 95%礦物油乳劑 | 95 | |
| | | 31.6%丁基加保扶乳劑 | 400 | 21 |
| | 柑桔潛葉蛾 | 2.5%賽洛寧微乳劑 | 4,000 | 14 |
| | | 25%芬諾克可濕性粉劑 | 2,000 | 12 |
| | | 50%馬拉松乳劑 | 800 | 4 |
| | | 25%芬諾克可濕性粉劑 | 2,000 | 12 |
| | | 30%福隆納乃得水懸劑 | 1,500 | 20 |
| | 星天牛 | 40.64%加保扶水懸劑 | 100 | 10 |
| 10至12月 | 柑桔葉蟎、銹蟎 | 30%賜派芬水懸劑 | 5,000 | 6 |
| | | 10%得芬瑞可濕性粉劑 | 3,000 | 9 |
| | | 20%畢達本可濕性粉劑 | 3,000 | 6 |
| | | 95%可濕性硫磺可濕性粉劑 | 100 | |
| | | 95%礦物油乳劑 | 95 | |
| | | 5%芬普蟎水懸劑 | 1,000 | 21 |
| | 薊馬 | 48.34%丁基加保扶乳劑 | 1,000 | 21 |
| | 柑桔木蝨、刺粉蝨 | 44%大滅松乳劑 | 1,000 | |
| | | 40.64%加保扶水懸劑 | 1,200 | 7 |
| | | 50%馬拉松乳劑 | 800 | 4 |
| | 蚜蟲 | 50%馬拉松乳劑 | 800 | 4 |
| | | 40%丁基加保扶可濕性粉劑 | 1,200 | 20 |
| | | 40.64%加保扶水懸劑 | 1,200 | 10 |
| | 介殼蟲 | 50%馬拉松乳劑 | 800 | 4 |
| | | 44%大滅松乳劑 | 1,000 | |
| | | 95%礦物油乳劑 | 95 | |
| | | 31.6%丁基加保扶乳劑 | 400 | 21 |
| | 果實蠅 | 50%芬殺松乳劑 | 1,000 | 21 |

| 時 間 | 主要蟲害 | 藥 劑 | 稀釋倍(倍) | 安全採收(天) |
|---|---|---|---|---|
| 10至12月 | 果實蠅 | 20%芬化利乳劑 | 2,000 | 9 |
| | | 25%馬拉松可濕性粉劑 | 100 | |

## 梨蟲害防治曆

| 時 間 | 主要蟲害 | 藥 劑 | 稀釋倍數 | 安全採收期(天) |
|---|---|---|---|---|
| 1至3月 | 梨瘤蚜 | 48.34%丁基加乳劑保扶 | 1,200 | 15 |
| | | 80%可濕性硫黃水分散性粒劑 | 400 | |
| | | 50%加護滅必蝨可濕性粉劑 | 1,000 | 9 |
| | 介殼蟲 | 40.64%加保扶水懸劑 | 1,200 | |
| | | 40.8%陶斯松乳劑 | 2,000 | |
| | | 20%布芬三亞蟎乳劑 | 750 | 21 |
| 4至6月 | 二點葉蟎 | 18.3%芬殺蟎水懸劑 | 3,000 | 9 |
| | | 20%畢達本可濕性粉劑 | 2,000 | 6 |
| | | 25.1%畢芬寧乳劑 | 5,000 | 12 |
| | 木蝨 | 25%布芬淨可濕性粉劑 | 1,500 | 9 |
| | | 18.3%芬殺蟎水懸劑 | 3,000 | 9 |
| | | 9.6%益達胺溶液 | 1,500 | 9 |
| | | 20%達特南水溶性粒劑 | 2,000 | 10 |
| | | 99%礦物油乳劑 | 300 | |
| | 梨瘤蚜 | 48.34%丁基加保扶乳劑 | 1,200 | 15 |
| | | 80%可濕性硫黃水分散性粒劑 | 400 | |
| | | 50%加護滅必蝨可濕性粉劑 | 1,000 | 9 |
| | 梨綠蚜 | 40%丁基加保扶可濕性粉劑 | 1,200 | 9 |
| | | 20%亞滅培水溶性粉劑 | 4,000 | 6 |
| | | 2.5%賽洛寧微乳劑 | 2,000 | 6 |
| | 介殼蟲 | 40.64 加保扶水懸劑 | 1,200 | |
| | | 40.8%陶斯松乳劑 | 2,000 | |
| | | 20%布芬三亞蟎乳劑 | 750 | 21 |
| 7至9月 | 梨木蝨 | 25%布芬淨可濕性粉劑 | 1,500 | 9 |
| | | 18.3%芬殺蟎水懸劑 | 3,000 | 9 |
| | | 9.6%益達胺溶液 | 1,500 | 9 |
| | | 20%達特南水溶性粒劑 | 2,000 | 10 |
| | | 99%礦物油乳劑 | 300 | |
| 10至12月 | 梨木蝨 | 25%布芬淨可濕性粉劑 | 1,500 | 9 |
| | | 18.3%芬殺蟎水懸劑 | 3,000 | 9 |
| | | 9.6%益達胺溶液 | 1,500 | 9 |
| | | 20%達特南水溶性粒劑 | 2,000 | 10 |
| | | 99%礦物油乳劑 | 300 | |
| | 梨瘤蚜 | 48.34%丁基加乳劑保扶乳劑 | 1,200 | 15 |

| 時 間 | 主要蟲害 | 藥 劑 | 稀釋倍(倍) | 安全採收(天) |
|---|---|---|---|---|
| 10 至 12 月 | 梨瘤蚜 | 80%可濕性硫黃水分散性粒劑 | 400 | |
| | | 50%加護滅必蝨可濕性粉劑 | 1,000 | 9 |

## 柿蟲害防治曆

| 時 間 | 主要蟲害 | 藥 劑 | 稀釋倍(倍) | 安全採收(天) |
|---|---|---|---|---|
| 4 至 6 月 | 斜紋夜盜 | 2.8%賽洛寧乳劑 | 2,000 | 6 |
| | | 9.6%益達胺溶液 | 1,500 | 12 |
| | | 19.7%得芬諾水懸劑 | 2,000 | 21 |
| | 薊馬 | | | 未推薦藥劑 |
| | 介殼蟲 | 11%百利普芬乳劑 | 1,500 | 6 |
| | | 50%馬拉松乳劑 | 800 | 8 |
| 7 至 9 月 | 斜紋夜盜 | 2.8%賽洛寧乳劑 | 2,000 | 6 |
| | | 9.6%益達胺溶液 | 1,500 | 12 |
| | | 19.7%得芬諾水懸劑 | 2,000 | 21 |
| | 介殼蟲 | 11%百利普芬乳劑 | 1,500 | 6 |
| | | 50%馬拉松乳劑 | 800 | 8 |
| 10 至 12 月 | 介殼蟲 | 11%百利普芬乳劑 | 1,500 | 6 |
| | | 50%馬拉松乳劑 | 800 | 8 |
| | 斜紋夜盜 | 2.8%賽洛寧乳劑 | 2,000 | 6 |
| | | 9.6%益達胺溶液 | 1,500 | 12 |
| | | 19.7%得芬諾水懸劑 | 2,000 | 21 |

## 桃樹蟲害防治曆

| 時間 | 主要害蟲 | 藥劑 | 稀釋倍數(倍) | 安全採收(天) |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 月 | 蚜蟲 | 2.8%畢芬寧乳劑 | 1,400 | 10 |
| | 桑介殼蟲 | 95%夏油乳劑 | 20 | |
| | 二點葉蟎 | 1%密滅汀乳劑 | 1,000 | 15 |
| 4-6 月 | 毒蛾類 | 2.8%賽洛寧乳劑 | 1,000 | 6 |
| | 蚜蟲 | 2.8%畢芬寧乳劑 | 1,400 | 10 |
| | 桑介殼蟲 | 95%夏油乳劑 | 20 | 0 |
| | 二點葉蟎 | 1%密滅汀乳劑 | 1,000 | 15 |
| | 桃折心蟲 | 2.8%賽洛寧乳劑 | 1,000 | 6 |
| 7-9 月 | 桃葉蟬 | 3%亞滅寧水基乳劑 | 1,000 | 6 |
| | | 2.8%賽洛寧乳劑 | 1,000 | 6 |
| | 蚜蟲 | 2.8%畢芬寧乳劑 | 1,400 | 10 |
| | 二點葉蟎 | 1%密滅汀乳劑 | 1,000 | 15 |
| 10-12 月 | 桃葉蟬 | 3%亞滅寧水基乳劑 | 1,000 | 6 |
| | | 2.8%賽洛寧乳劑 | 1,000 | 6 |
| | 蚜蟲 | 2.8%畢芬寧乳劑 | 1,400 | 10 |
| | 二點葉蟎 | 1%密滅汀乳劑 | 1,000 | 15 |