

# 颱風豪雨過後

## 籲請農友加強預防木瓜疫病發生

高屏地區100年8月29日遭受南瑪都颱風侵襲，連日豪雨，導致果園有積水現象，容易滋生作物病害，高雄場呼籲果農，風雨過後須特別注意防範木瓜疫病(俗稱水傷)發生，以免造成重大損失。

目前高屏地區除木瓜及香蕉外，大多熱帶果樹都尚非結果期，而連續陰風雨過後最容易發生木瓜果實疫病。該病病徵是在果實頂端近果柄處

出現水浸狀不規則斑塊，隨後產生白色菌絲及孢囊，嚴重時，果實大半被白色菌絲覆蓋，罹病果常落地而腐爛；疫病菌也會感染木瓜莖基部，導致組織腐敗而整株倒伏。病菌主要藉風雨飛濺傳播，非洲大蝸牛(陸螺)爬至木瓜果實上，也會加速疫病的感染。

為預防疫病發生，雨後要迅速排除果園積水，澈底清除落葉落果，並即時展開施藥防治工作。木瓜果實疫病防治用藥方面，可依表內的推薦用藥施用，其中「亞托敏」可兼防炭疽病、蒂腐病；此外，再加強田間衛生管理，就可大幅減少病害發生的機會。農友在防治上如有其他疑問或用藥問題，請逕洽本場植物保護研究室，研究人員將竭誠為農民服務。 ●

藥名	濃度	安全採收期(天)
23%亞托敏水懸劑	1,000倍	9
50%達滅芬可濕性粉劑	3,000倍	9
9.4%賽座滅水懸劑	2,000倍	12
81.3%嘉賜銅	1,000倍	6



木瓜果實疫病病徵



任意丟棄受害果實易造成疫病大發生



疫病也會感染木瓜莖基部造成整株倒伏