表一、葫蘆科作物上銀葉粉蝨防治藥劑

藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制*	備註
0.5%可尼丁粒劑		限植穴使用	4A	
16%可尼丁水溶性粒劑	3,000	採收前9天停止施藥	4A	
9.6%益達胺溶液	1,500	洋香瓜、香瓜、西瓜採收前21天停止施藥，其他瓜類採收前6天停止施藥	4A	
9.6%益達胺水懸劑	1,500	洋香瓜、香瓜、西瓜採收前21天停止施藥，其他瓜類採收前6天停止施藥	4A	
25%派滅淨可濕性粉劑	1,200	採收前6天停止施藥	9B	
2.4%第滅寧水懸劑	1,000	採收前6天停止施藥	3A	胡瓜除外
10%賽速安水溶性粒劑	4,000	採收前6天停止施藥	4A	胡瓜除外
20%達特南水溶性粒劑	3,000	採收前6天停止施藥	4A	胡瓜除外
11%百利普芬乳劑	1,000	採收前9天停止施藥	7C	胡瓜除外
25%布芬淨可濕性粉劑	1,000	採收前15天停止施藥	16	胡瓜除外
2.8%畢芬寧乳劑	1,000	採收前6天停止施藥	3A	限洋香瓜
2.5%畢芬寧水懸劑	1,000	採收前6天停止施藥	3A	限洋香瓜
2%阿巴汀乳劑	1,000	採收前12天停止施藥	6	限洋香瓜
10%氟尼胺水分散性粒劑	2,000	採收前6天（設施栽培12天）停止施藥	9C	限洋香瓜
9.4%六伏隆水懸劑	1,500	採收前15天停止施藥	15	限洋香瓜

*作用機制分類編號相同者為同一類藥劑，建議應輪流使用。

表二、茄科作物上銀葉粉蝨防治藥劑

藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制	備註
10.4%貝賽益達胺水懸劑	2,000	採收前6天停止施藥	3A+4A	
20%亞滅培水溶性粉劑	4,000	採收前6天（設施栽培12天）停止施藥	4A	
20%達特南水溶性粒劑	3,000	採收前3天停止施藥	4A	限番茄
40.4%賽果培水懸劑	3,300	採收前10天停止施藥	4A	限番茄
10%氟尼胺水分散性粒劑	3,000	採收前6天（設施栽培12天）停止施藥	9C	限番茄