

台灣本土植物之開發與利用

珊瑚樹、**枯里珍**

黃雅玲

台灣地處熱帶及亞熱帶，植物種類繁多，分布於恆春半島的原生植物約有 1,200 餘種，60 種為台灣特有種，有些品種觀賞價值極高，可馴化為本土性的盆栽花卉，提供農民利用。高雄區農業改良場這些年來致力於原生植物的開發與利用，有原生野牡丹科植物品種蒐集及利用、原生秋海棠品種蒐集選育及恆春半島具觀賞價值之原生植物盆花栽培技術之建立，由於試驗上可供利用的資源極少，因此一路上筆路藍縷的走來極為辛苦，但由於這類植物不僅生長勢強健，對病蟲害、旱害及風害的抗性亦強，且觀賞價值極高，因此仍值得繼續研究及開發利用。

【具開發潛力原生植物品種介紹】

原生植物中有很多頗具發展潛力的品種，以下僅針對本場開發的原生植物——枯里珍及珊瑚樹，加以介紹其植栽特性、繁殖技術及栽培管理方法：

珊瑚樹



▲珊瑚樹鮮紅色的果實在年節時很受喜愛

珊瑚樹 (*Viburnum odoratissimum* Ker.) 為忍冬科的常綠小喬木，花成串白色，果實紫紅色，在年節期間顯的極為喜氣。珊瑚樹在繁殖上可利用播種及扦插，播種繁殖可採收紫褐色

果實播種，但須注意其種子具有很長的休眠期，有時可長達七個月之久，如要大量快速繁殖種原可利用扦插法，通常以半老熟或老熟枝條扦插於砂土，扦插存活率較高；由於珊瑚樹果實為成串紅色，可做為觀果盆栽或庭園植物，此樹種應是值得加以推廣的原生植物。



▲珊瑚樹常在組合盆栽中作為主體

枯里珍

枯里珍 (*Antidesma pentandrum* Merr.) 為大戟科的常綠灌木，屬於單性花，雌雄異株，雄花頂生穗狀花序，花期為每年 1~5 月，果期為 3~9 月，其成串果實因成熟期不同，常同時有綠色、黃色、紅色及黑色的果實，果實型態極為特殊，觀賞價值高，且其室內耐陰性極強。繁殖方法以扦插為主，其介質比例為泥炭土：珍珠



▲枯里珍果實顏色豐富（由綠→黑）果型特殊甚具觀賞價值

石：蛭石（2:1:1），扦插環境須保持高溼度，存活率可達 100%。植株扦插存活後約二個月，可換五吋盆繼續培育，該植物對病蟲害的抗性極佳，馴化改良後，可利用為室內盆栽花卉。