



觀賞用洛神葵雞尾酒系列



品種介紹

文·圖 / 陳進分

前言

洛神葵屬錦葵科植物，學名為 *Hibiscus sabdariffa* L. 廣泛栽培於熱帶與亞熱帶地區，莖皮可取代黃麻製作粗麻布或繩索、嫩梢可當蔬菜食用，果萼可作果醬、布丁、果汁、糕餅、藥用、觀賞等。觀賞用洛神葵以雞尾酒 Cocktail 系列之品種為主，本文介紹雞尾酒乳白、雞尾酒紅、雞尾酒紫、雞尾酒紫紅等品種。

品種性狀

雞尾酒乳白或稱雞尾酒象牙白，株高約 120 公分，葉呈鳥趾狀、葉緣波狀鋸齒，葉長約 10~12 公分，寬 9~12 公分，分枝數 5~12 枝，莖及葉均為黃綠色。

花瓣黃色，花喉黃色(圖 1)。果實黃綠色，果萼上無直刺毛(圖 2)。單果萼鮮重 2.3~4.5 公克，果萼厚度 2~3 公厘。春播，始花日數約 60 天。夏播，始花日數約 30 天。

雞尾酒紫，株高約 130 公分，葉鳥趾狀，葉緣波狀鋸齒，葉長約 12~15 公分，寬 8~12 公分，分枝數 11~17 支，葉色深綠，莖紫紅色。花瓣紅色，花喉暗紅色(圖 3)。果實紫色(圖 4)，果萼上直刺毛中等，一片果萼約 60~70 支。單果萼鮮重 2.1~3.1 公克，果萼厚度 2~3 公厘。春播與夏播之始花期與雞尾酒乳白相同。

雞尾酒紅，株高約 140 公分，葉 3 裂，細鋸齒緣，葉長約 14~19 公分，寬約 9~12 公分，分枝數 8~11 支，葉色深綠，莖紅色。花瓣淡黃色，花喉暗紅色(圖 5)。果實鮮紅色，果萼上直刺毛少，



圖 1. 雞尾酒乳白品種的花



圖 2. 雞尾酒乳白品種的果實



圖 3. 雞尾酒紫品種的花



圖 4. 雞尾酒紫品種的果實



圖 5. 雞尾酒紅品種的花



圖 6. 雞尾酒紅品種的果實



圖 7. 雞尾酒紫紅品種的花



圖 8. 雞尾酒紫紅品種的果實

一片果萼約 10~20 支 (圖 6)。單果萼鮮重 2.3~3.9 公克，果萼厚度 2.2~2.7 公厘。春播與夏播之始花期比雞尾酒乳白延遲 1~2 週。

雞尾酒紫紅，株高約 130 公分，葉 3 裂，邊緣鋸齒，葉長約 18~26 公分，寬約 14~18 公分，分枝數 6~14 支，葉深綠，莖紫紅色。花瓣紫紅，花喉深紅 (圖 7)。果實深紫紅色 (圖 8)，果萼上直刺毛少，約 20~30 支，單果萼鮮重 3.6~5.8 公克，果萼厚度 2.3~3.8 公厘。春播，始花日數約 90~100 天。夏播，始花日數約 40~50 天。

栽培管理注意事項

一、光線

雞尾酒 Cocktail 系列為好光性品種，宜全日照栽培，光線不足之環境，植株生育不佳。

二、溫度

喜好溫暖之氣候，栽培適溫在 28~32℃ 之間，溫度愈低發育愈遲緩，10℃ 以下會有寒害之症狀出現，葉色變黃或紅，繼而枯萎掉落，接著整株死亡。

三、盆器

盆栽時要注意盆器大小，洛神葵為亞灌木，以 10 吋大白盆栽較佳，盆器太



小植株生育不佳，開花結果量少。

四、介質

以疏鬆且保水之介質栽培為佳，可用純泥炭土或泥炭土混合少量之河砂、真珠石、蛭石等栽培，以田土或混合田土當介質栽培時，要注意採用無鎌胞菌及疫病菌之土壤。

五、播種

一般先以穴盤育苗再移植於大白盆中之栽培方式，植株生育較整齊；亦有直播栽培，每盆播 2~3 粒種子，待種子發芽，本葉長出 2 片時，再予以間拔，每盆留最強壯之苗即可。

六、灌溉

盆栽時灌溉非常重要，洛神葵雖是耐旱之作物，但缺水時營養生長不良，開花結果不佳。在沒有下雨時，每隔 3~4 日應澆水一次，不宜每日澆水，介質太濕根部易腐爛，反而造成植株死亡。

七、施肥

栽培初期可施用 $N:P_2O_5:K_2O=14:14:14$ 之長效性肥料，每月每盆施用 5 公克，花蕾著生期可施用含磷較高 $N:P_2O_5:K_2O=12:23:12$ 之長效性肥料，每月每盆施用 5 公克。少量多次施用是盆栽施肥原則。

八、病蟲害

危害洛神葵的蟲害有粉介殼蟲、葉

蟬、蝶蛾幼蟲等，病害有炭疽病、莖腐病、白粉病等，其他如蝸牛、蛭蝨等亦會造成危害。家庭式盆栽以人工摘除罹病枝葉方式，或噴施有機病蟲害防治資材如肉桂油、窄域油、印棟素等。經濟生產時，則需配合藥劑防治，可參考植物保護手冊或洽本場植保研究室提供相關防治技術。

結語

這 4 個觀賞品種可在夏天開花結果，與本場選育之新品種洛神葵臺東 1 號、臺東 2 號、臺東 3 號及傳統之加工品種之開花結果期不同。雞尾酒系列品種配合不同之播種期，在夏；秋兩季都可培育觀賞盆栽，果萼雖可食用，但果萼較小與加工用品種之果萼鮮重 8~9 公克相比，差異甚大。