

## 小米蟲害防治方法

防治時期	防治對象	防治方法					備註
		防治資材	稀釋倍數(倍)	安全採收天數	注意事項	其他防治方法	
定植前及苗期	切根蟲	5%陶斯松粒劑	20kg/公頃	-	1. 在畦上撒佈一次，並以鐵耙拌土約5公分，定植後一週再施藥一次 2. 限定植前及定植後一週使用	1. 與水田輪作或種植前淹水1週以上，以淹死土中殘存的幼蟲或蛹。	禾本科雜類類切根蟲
苗期至生育期	蚜蟲類	苦楝油		-	1. 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 2. 苦楝油依產品推薦濃度稀釋後施用。	1. 設置黃色黏蟲紙誘殺有翅型成蟲，降低擴散機會。 2. 利用噴水設施提高田間溼度，降低害蟲之發生密度。	小米蚜蟲類
		無患子液	200-500	-			
		25%納乃得可溶性粉劑	750	15			
		40%納乃得可溶性粉劑	1,250	15			
		40%納乃得可溶性粒劑	1,250	15			
		40%納乃得可溶性袋劑	1,250	15			
生育期	螟蛾類	100G/L(10%w/v)諾伐隆水分散性乳劑	1,500	10	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	田間發現被害株時，手動摘除並移出田間。	小米鱗翅目害蟲
		10%依芬寧乳劑	750	15	害蟲發生時開始施藥，10-14天施藥一次，連續3次。		禾本科雜糧類鱗翅目害蟲
		20%依芬寧可溼性粉劑	1,500	15			
生育期	毒蛾類	5.87%賜諾特水懸劑	1,500	9	害蟲發生時開始施藥，10天後再施藥一次，連續2次。	田間發現幼蟲為害時，手動摘除並移出田間。	小米毒蛾類
		11.7%賜諾特水懸劑	3,000	9			
生育期	夜蛾類	100G/L(10%w/v)諾伐隆水分散性乳劑	1,500	10	害蟲發生時開始施藥，7天後再施藥一次。	田間發現幼蟲為害時，手動摘除並移出田間。	小米鱗翅目害蟲

防治時期	防治對象	防 治 方 法				備註
		防治資材	稀釋倍數 (倍)	安全採 收天數	注 意 事 項	
		5.87%賜諾特水懸劑	1,500	9	害蟲發生時開始施藥，10 天後再施藥一次，連續 2 次。	小米夜蛾類
		11.7%賜諾特水懸劑	3,000	9		
		10%依芬寧乳劑	750	15	害蟲發生時開始施藥，10-14 天施藥一次，連續 3 次。	禾本科雜糧類鱗翅目害蟲
		20%依芬寧可溼性粉劑	1,500	15		

備註：

- 一、其他防治藥劑可參考主管機關之公告或參閱農藥資訊網(<http://pesticide.baphiq.gov.tw>)
- 二、每次施藥時，請勿同時混用多種藥劑，避免藥害及農藥殘留發生。
- 三、推薦用藥及安全採收期僅適用國內，外銷用藥須符合輸入國檢疫規範。