

腎藥蘭栽培現況

文·圖／翁一司



常見的腎藥蘭盆花品種

腎藥蘭(*Renanthera* 或稱為火焰蘭)為單莖附生蘭類，原生種目前有21種，主要分布於印度東部、中國南部及東南亞地區。腎藥蘭花色有淡黃綠、橘紅、紅色，有的有紅或紫色斑點。常見的腎藥蘭多為紅色，且花枝上小花眾多，有些種類其花序上

超過100朵的小花，開花時非常壯觀。

腎藥蘭的栽培依市場需求不同可分為盆花及切花。盆花市場需求量少，常見的盆花品種有 *Ren. Monachica* (俗稱小美女腎藥蘭)、*Ren. Scarlet Yuka*、*Ren. Kalsom*、*Ren. Singaporeans*、*Ren. philippinensis*、*Ren. citrina* 等。而切花的生產約從民國90年左右開始，業者由東南亞引進數種具腎藥蘭親緣的屬間雜交種，剛開始於中部地區種植，植株不易開花，經富麗花卉農場蔡坤富先生於屏東地區試種，開花表現良好，並挑選適合切花的種類開始以組織培養大量繁殖，栽培面積也逐年增加，目前主要栽培於屏東地區，栽培面積約10公頃，已進入量產的面積約

5公頃，主要產期在5~6月及9~11月。

腎藥蘭切花生產模式，從出瓶苗開始培養至中苗約需1年，中苗定植後至成株開花約需1.5年至2年，第3~4年後才開始進入量產階段。栽培條件可於50%遮光網下種植，每分地種植數量約6,000~8,000株，成株後每株每年約可生產4~6枝切花。

因其耐病性強，栽培管理容易，瓶插壽命長，以高屏地區的氣候條件，應可穩定生產，但冬季期間氣溫過低仍會影響植株的生長。雖然目前栽培面積不多，但隨著栽培面積逐漸增加，除供應內銷市場需求外，也開始進行外銷，為極具發展潛力的熱帶花卉。



腎藥蘭幼苗培育情形



腎藥蘭於50%遮光網下種植



易積水地區墊高床架種植