番茄病蟲害防治藥劑

1.0 版 100.05.11 整理
1.1 版 100.08.29 整理
1.2 版 100.10.13 整理
1.3 版 101.03.29 更新

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
根瘤線蟲	10%毆殺滅粒劑	依公頃施用量使用	種植前施用	1A
	10%托福松粒劑			1B
	45%普伏松乳劑			1B
	10%福賽絕粒劑			1B
	10%芬滅松粒劑			1B
	3%加保扶粒劑			1A
	80%滅線蟲乳劑			
	10%毆殺滅溶液	200		1A
	75%福賽絕乳劑	600-1000		1B
晚疫病	250g/L 曼普胺水懸劑	2500	15(設施 21)	F5
	17.7%安美速水懸劑	4000	6(設施 12)	C4
	18.7%達滅克敏水分散性粒劑	1000	6(設施 12)	F5,C3
	23%亞托敏水懸劑	1000	6	C3
	52.5%凡殺克絕水分散性粒劑	2500	6	C3,27
	9.4%賽座滅水懸劑	3000	6	C4
	50%達滅芬可濕性粉劑	4000	6	F5
	70%甲基鋅乃浦可濕性粉劑	500	7	M3
	75%四氯異苯腈水分散性粒劑	600	7	M5
	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	600	7	M5
	33%鋅錳乃浦水懸劑	600	6	M3
	72%鋅錳克絕可濕性粉劑	500	7	M3
	80%錳乃浦可濕性粉劑	400	7	M3
	80%免得爛可濕性粉劑	500	7	M3
	80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	500	7	M3

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	63.02%鹼性氯氧化銅水分散性粒劑	400	-	M1
疫病	23%亞托敏水懸劑	1000	6(設施 12)	C3
	50%達滅芬可濕性粉劑	4000	6(設施 12)	F5
	250g/L 曼普胺水懸劑	2500	15(設施 21)	F5
早疫病	37.5%氫氧化銅水懸劑	400-800	-	M1
	77%氫氧化銅可濕性粉劑	800	6	M1
	57.6%氫氧化銅水分散性粒劑	1200	-	M1
	81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	1000	3	D3, M1
	10%保粒黴素(甲)可濕性粉劑	800	-	H4
	58%松香酯銅乳劑	1500	6	M1
葉黴病	80%錳乃浦可濕性粉劑	400	7	M3
	80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	500	7	M3
灰黴病	23.7%依普同水懸劑	1000	6	E3
	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000	6	E3
幼苗疫病	35%依得利可濕性粉劑	3000	限苗期使用	F3
	25%依得利乳劑	1500	限苗期使用	F3
	66.5%普拔克溶液	400	限苗期使用	
苗立枯病	5%本達樂粒劑	0.6 公斤/公頃	限苗期使用	A1
白絹病	50%福多寧可濕性粉劑	5000	限苗期使用	C2
	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000	限苗期使用	E3
細菌性斑點病	81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	1000	6	D3, M1
	53.8%氫氧化銅水分散性粒劑	2000	6	M1
	61.4%氫氧化銅水分散性粒劑	1500		M1
	27.12%三元硫酸銅水懸劑	500	3	M1

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
白粉病	99%礦物油乳劑	500		
炭疽病	22.7%腈硫醌水懸劑	700	4	M9
	23.6%百克敏乳劑	3000	6	C3
番茄夜蛾	34%硫敵克水懸劑	1000	3	1A
	75%硫敵克可濕性粉劑	4000	3	1A
	50%馬拉松乳劑	500	4	1B
	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	4	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	4	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	900	4	1A
	14.5%因得克水懸劑	2000	6	22A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1500	6	3A
	40%益滅賽寧可濕性粉劑	2500	6	3A,
	44.9%陶斯松乳劑	1000	6	1B
	50%陶斯寧乳劑	1500	6	1B, 3A
	2.15%因滅汀乳劑	1500	6	6
	4.4%祿芬隆乳劑	1500	6	15
	13.5%納得亞滅寧乳劑	1000	6	1A, 3A
	85%加保利可濕性粉劑	850	7	1A
	10%克凡派水懸劑	1000	9	13
	2.5%賽洛寧微乳劑	1000	10	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	1000	10	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	10	3A
	10%諾伐隆乳劑	1500	12	15
	5%克福隆乳劑	2000	15	15

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
甜菜夜蛾	2.5%畢芬寧水懸劑	1500	10	3A
	2.8%畢芬寧乳劑	1500	10	3A
夜蛾類、毒蛾類	35%白克松可濕性粉劑	3000	15	1B
	2.5%賽洛寧微乳劑	1000	10	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	1000	10	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	10	3A
	75%硫敵克可濕性粉劑	4000	3	1A
	50%馬拉松乳劑	500	4	1B
粉蝨類	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	6(設施 12)	4A
	20%達特南水溶性粒劑	3000	3	4A
	10.4%貝賽益達胺水懸劑	2000	6	3A, 4A
	40.4%賽果培水懸劑	3300	10	4A
	10%氟尼胺水分散性粒劑	3000	6(設施 12)	9C
番茄斑潛蠅	2%阿巴汀乳劑	1000	12	6
	75%賽滅淨可濕性粉劑	4000	12	17
	8.9%賽滅淨溶液	1000	12	17
薊馬	2.5%賜諾殺水懸劑	1000	3	5
	2.8%第滅寧乳劑	1500	6	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	9.6%益達胺溶液	2000	6	4A
	9.6%益達胺水懸劑	2000	6	4A
	25%福化利乳劑	3000	7	3A
	2.9%貝他-賽扶寧乳劑	1500	9	3A
	43%佈飛松乳劑	800	10	1B
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	6(設施 12)	4A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	6	3A

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	6	3A
	50%滅賜克可濕性粉劑	800	15	1A
切根蟲	5%陶斯松粒劑	30 公斤/公頃	種植前施用	1B
	3%加福松微粒劑	50 公斤/公頃		1B
葉蟎類	2.5%賽洛寧微乳劑	1000	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	1000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	6	3A

1. ◎：混合藥劑
2. 上述資料更新日期為 2012 年 3 月 29 日，如有錯誤，以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959