馬鈴薯病蟲害防治藥劑

1.0 版 100.09.14 整理
1.1 版 100.10.13 整理
1.2 版 101.03.29 更新

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
晚疫病	52.5%凡殺克絕水分散性粒劑	2500	6	C3, 27
	23%亞托敏水懸劑	1000	7	11, C3
	50%達滅芬可濕性粉劑	4000	7	40, F5
	64%鋅錳毆殺斯可濕性粉劑	500	14	M3, A1
	4－4 式波爾多液			M1
	80%錳乃浦可濕性粉劑	400	7	M3
	83%氫氧化銅可濕性粉劑	400	7	M1
	63.02%鹼性氯氧化銅水分散性粒劑	400	-	M1
	53%鋅錳右滅達樂水分散性粒劑	400	12	M3, A1
	58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑	400	12	M3, A1
	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	600	7	M5
	75%四氯異苯腈水分散性粒劑	600	7	M5
	70%甲基鋅乃浦可濕性粉劑	500	7	M3
	18.7%達滅克敏水分散性粒劑	1000	7	F5,C3
	80%免得爛可濕性粉劑	500	14	M3
	80%免得爛水分散性粒劑	500	14	M3
	80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	500	14	M3
	33%鋅錳乃浦水懸劑	600	12	M3
疫病	23%亞托敏水懸劑	1000	6(設施 12)	C3
	50%達滅芬可濕性粉劑	4000	6(設施 12)	F5
白絹病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000		2, E3
	50%福多寧可濕性粉劑	5000		7, C2
蚜蟲	5%硫伐隆粒劑	30 公斤/公頃	種薯下種後施用一次	1A

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
切根蟲	0.5%芬化利粒劑	50 公斤/公頃	定植前、定植後各施用一次	3A
	3%加福松微粒劑	50 公斤/公頃	定植前 3 施藥	1B
夜蛾類	20%芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	20%芬化利乳劑	3000	14	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5000	10	3A
	5%芬化利乳劑	2000	10	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	9	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	9	3A
	75%硫敵克可濕性粉劑	3000	6	1A
粉蝨類	10.4%貝賽益達胺水懸劑	2000	6	3A; 4A
	20%達特南水溶性粒劑	3000	3	4A
斑潛蠅類	2%阿巴汀乳劑	1000	12	6
葉部薊馬類	9.6%益達胺溶液	2000	6	4A
	9.6%益達胺水懸劑	2000	6	4A
	2.5%賜諾殺水懸劑	1000	3	5
	2.9%貝他-賽扶寧乳劑	1500	9	3A
	43%佈飛松乳劑	800	10	1B
	25%福化利乳劑	3000	7	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	6	3A
葉蟎類	2.5%賽洛寧微乳劑	1000	6	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	1000	6	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	6	3A

1. -：免訂容許量

2. 上述資料更新日期為 2012 年 3 月 29 日，如有錯誤，以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959