表一、萌前除草劑對兩種盆栽蔓澤蘭的防除效果。

Table 1. Effects of pre-emergence herbicides on *Mikania* pot test.

Herbicide	Rate (kg ai/ha)	Control (%) *Mikania cordata*	*Mikania micrantha*
atrazine	0.5	100	100
草脫淨	0.375	100	98
	0.25	100	100
butachlor	1.176	85	82
丁基拉草	0.882	63	65
	0.588	51	61
dimethenamid	0.7	97	96
汰草滅	0.525	84	70
	0.35	75	67
dinitramine	0.75	61	70
撻乃安	0.563	52	54
	0.375	48	50
diuron	1.6	100	100
達有龍	1.2	100	100
	0.8	98	100
metazachlor	0.647	85	89
滅草胺	0.485	56	64
	0.323	55	61
metribuzin	0.7	100	100
滅必淨	0.525	100	100
	0.35	100	100
oxadiazon	4.4	93	99
樂滅草	3.3	89	98
	2.2	81	84
oxyfluorfen	0.235	100	100
復祿芬	0.176	100	100
	0.118	100	100
pendimethalin	1.02	85	89
施得圃	0.765	79	77
	0.51	63	58
S-metolachlor	1.048	80	90
左旋莫多草	0.786	67	59
	0.47	54	53
LSD $_{(0.05)}$	13	11	

Herbicides were applied at 7 days after planting of seeds.
Data on fresh weight was collected at 28 days after herbicide application (DAA).
Control % based data on fresh weight.