

品種

菜豆品種極多，按生長習性有矮性及蔓性之分。矮性者植株矮小，故可密植，生長時期短，採收期亦短；蔓性者植株有蔓高大，須立支柱，栽植距離大，採收期長。

1. 蔓性品種

- (1) 台中一號：台中區農業改良場育成的抗銹病品種，嫩莢淡綠色，莢形圓直，長 16~18 公分，較黑仁衣笠為長。播種後 48~63 天可採收，種子黑色，產量高品質良好。
- (2) 紅骨種：自泰國引入，莖部紫紅色，嫩莢綠色，莢形細圓稍彎曲，長 12~16 公分，易老化，種子黑色。播種後 45~50 天即可採收，產期集中，產量高，不抗病，適於平地春末夏初及秋作。
- (3) Kentucky Wonder：俗稱粉豆，嫩莢濃綠色，莢形長而稍彎曲，種子部分凸出，外觀欠佳，莢厚而柔軟，品質極佳，抗病、豐產。
- (4) 灰仁：種子灰色故稱灰仁，嫩莢淺綠，莢形圓，長 17~18 公分，品質中等，播後 45~50 天即可採收。
- (5) 紫衣：特早生，結莢多，胚軸、莖、葉柄、花均為紫紅色。莢紫紅色，莢形扁平寬大，長 23 公分，寬 2 公分，無筋，品質柔嫩，種子黑色，耐熱。

2. 矮性品種

- (1) 契斯頓(Keystone)：種子白色，嫩莢濃綠，莢形粗圓端直，長 10~11 公分，無筋，品質優，適於加工。播種後 45~50 天採收。
- (2) 司麥露(Similo)：早生、白花，花期集中，可一次採收，適於冷凍加工。
- (3) 農友早生：極早生，播種 45 天左右開始採收。花白色，莢綠色，莢形端直粗圓。無筋，品質佳，適於冷凍製罐，市場及家庭用。



白花菜豆(楊文振提供)



紫花菜豆(楊文振提供)