

行政院農委會臺中區農業改良場新聞稿

做好作物防災管理降低豪雨損害

102.5.21

鑑於近日臺灣海峽對流雲系仍旺盛，中南部陸地亦將有局部豪雨，行政院農業委員會臺中區農業改良場籲請農民針對栽培作物，儘速做好防災管理措施，以避免損害發生，並針對當前主要栽培作物提供相關措施如下，如需詳細資料可至本場網站(<http://tdares.coa.gov.tw>)栽培技術項下查詢：

水稻作物：中部地區稻作生育介於孕穗期至乳熟期之間，由於曬田期間遇長期降雨，曬田不易徹底，近成熟期若繼續降雨易發生倒伏，應注意排除田區積水。降雨提高濕度易誘發穗稻熱病發生，宜於降雨間歇期間，做好穗稻熱病防治工作。

蔬菜作物：積水蔬菜園，應立即排除積水，畦面土壤流失嚴重者，應加以培土。實施清園，清除落葉、枯枝敗葉與病果，以防病害蔓延，並加強露菌病、疫病、軟腐病等病害防治。停止施肥，直到天氣恢復正常與植株恢復生長，再酌施肥料。蔓性蔬菜栽培支柱或棚架如傾斜應扶正。受損嚴重菜園，應及時復耕，以迅速恢復生產。

果樹作物：儘速排除果園積水，若因積水導致植株枯萎時，應適度修剪與疏果以減少蒸散與養分消耗。植株恢復生長後，並酌施少量速效性追肥以恢復樹勢。近成熟期梨及葡萄裂果應剪除，以防病原菌蔓延，並加強露菌病與炭疽病等病害防治。甜柿若發生落果，可行環剝以抑制水分吸收與營養生長。百香果正值開花授粉期，可趁間歇放晴行人工授粉以改善著果。

花卉作物：加強田間排水，雨損枝葉易發生病蟲害，應迅速清理與適度修剪植株，加強病蟲害防治。立花網栽培花卉，倒伏後應儘快扶正，無立支架栽培花卉，應以竹枝輔助使其直立固定，以確保產品品質。雨期採收切花及切葉水分含量高，可適度於包裝場以電扇略為吹乾，減少採後病害發生。

雜糧作物：排除落花生及甘薯田區積水，因雨受損時應先清除枯枝敗葉，以免病害蔓延，待植株生長恢復，施用少量尿素或硫酸銨以恢復植株生長，並注意葉斑病、甘藷蟻象等病蟲害防治。

連絡人：推廣課 曾康綺
e-mail：tsengyj@tdais.gov.tw

電話：(04)8523101 轉 431
傳真：(04)8524784