


文・圖／陳思如



徐英忠表示，5月採收的蓮霧無需經過蓋黑網、環刻等繁複的催花流程，也不需擔心遇到颱風或寒流的風險，只要能將大果種蓮霧的裂果問題控制下來，就能夠用最少的成本投入，輕鬆賣得高價。徐英忠又說，施用鈣和硼控制蓮霧裂果，一定要下對時機。他在花芽剛出現時就在土表撒施硼和磷肥，花謝後和套袋前的幼果期各施用一次含氮素的鈣肥。透過這樣的方法，能夠成功將5月生產大果種的裂果率由一般的8-9成降至3成，梅雨來臨前甚至可以降到1成以下，且果實仍可維持相當的大小。降低裂果率不僅是提高產品良率，也可以延後採收成熟

裂果一直是蓮霧栽培上最棘手的問題，每年3月開始，隨著氣溫升高，裂果率便快速攀升，若遇梅雨季則情況更為嚴重。今年的模範農民得主徐英忠農友卻反向操作，利用花期施用鈣、硼，成功在5月栽培高品質的大果種蓮霧，在

鈣和硼在植物體內需經由蒸散流隨水分運移，因此經常受到空氣濕度等環境因子的影響，果實吸收鈣肥的關鍵時期為幼果期，故在中果期後施用鈣肥經常徒勞無功，無論葉面噴施氯化鈣、硝酸鈣、硼酸或硼砂，或由土壤施用硝酸銨鈣與硼砂，都應提前於花蕾期至幼果期施用，以求較佳的吸收效率及有效性，並達到預防裂果之成效。為能同時兼顧果實大小及色澤，施用含氮素的鈣肥之後，常需配合人工適量捻除新梢，可避免養分過度消耗，提高果實品質。



徐英忠生產的蓮霧果形碩大、裂果率低。



徐英忠生產的蓮霧果形碩大、裂果率低。

預防H7N9流感

Yes! 2014

從中國大陸有H7N9流感病例地區返國時，若出現發燒、咳嗽等症狀，請立即戴口罩就醫，並告知醫師旅遊史。

1 避免衛生

- 勤洗手，勤換內衣褲
- 避免與感冒患者有密切接觸
- 避免前往活禽市場
- 避免與禽類有密切接觸

2 避免聚餐

- 避免前往聚餐場所
- 避免與感冒患者有密切接觸
- 避免前往活禽市場
- 避免與禽類有密切接觸

3 要吃熟食

- 避免生食
- 避免與感冒患者有密切接觸
- 避免前往活禽市場
- 避免與禽類有密切接觸

行政院衛生署
TAIWAN CDC

疾病管制局
http://www.cdc.gov.tw

廣告