



## 防治方法

1. 控制種植密度，調節肥料供應，剪枝時盡量剪掉害蟲發生嚴重的枝條，並集中燒毀
2. 保護天敵瓢蟲、草蛉、寄生蜂等。
3. 用噴霧法灌溉可減少被害。
4. 施用殺蟲劑，在幼齡若蟲期施用，效果最好，在花卉上目前尚無推薦藥劑，可參考其他作物的防治法，現舉數例以供參考。

## 粉蝨類

1. 螺旋粉蝨 *Aleurodicus dispersus* Russel  
原分佈熱帶美洲，其後蔓延南太平洋熱帶地區，民國77年侵入本省，目前已由南部地區漸漸蔓延全省，有越來越嚴重的趨勢。

寄主植物很廣，花卉方面包括朱槿、聖誕紅、楓樹、羊蹄甲、紫荊、大理花、紅穗鐵莧、杜鵑、茉莉、美人蕉、菊花、爆竹紅、玫瑰、蜀葵……等。

本蟲產卵呈螺旋式排列，並覆蓋白色蠟粉，若蟲以口針吸食汁液，分泌蜜露，引發煤煙病，二齡後亦分泌白色蠟粉及蠟絲，到處飛揚。

2. 溫室粉蝨 *Trialeurodes vaporariorum* (Westwood)

為害菊花、非洲菊、翠菊、萬壽菊、向日葵、百日草、唐菖蒲、百合、洋桔梗、木芙蓉、朱槿等及若干蔬果。

成蟲體翅均純白色，比螺旋粉蝨小型，產生之蠟粉不多，通風不良的場所及早季受害比較嚴重。

## 防治方法

1. 保護天敵小蜂
2. 藥劑防治，除下述非洲菊溫室粉蝨推薦之昆蟲荷爾蒙型藥劑布芬淨外，可參考酌用其他作物推薦防治粉蝨藥劑。