

花卉蟲害

薊馬類

1. 台灣花薊馬 *Frankliniella intonsa* (Trybom)

寄主植物很廣，包括玫瑰、菊花、非洲菊、百合、夜來香、唐菖蒲、蝴蝶薑花、蘭花及若干蔬菜及果樹的花。

2. 菊花薊馬 *Microcephalothrips abdominalis* (Crawford)

以菊科植物花部為主，如菊花、非洲菊、萬壽菊、大理花、大波斯菊、翠菊等。

3. 花薊馬 *Thrips hawaiiensis* (morgan)

主要為害花器，常為害的花卉有：康乃馨、玫瑰、大理花、菊花、金魚草、唐菖蒲、夜來香、孤挺花、百合、蘭花等。

4. 南黃薊馬 *Thrips palmi* Karny

寄主植物：菊花、非洲菊、大理花、向日葵、康乃馨、石竹等，主要為害部位為花及葉。

5. 唐菖蒲薊馬 *Thrips simplex* (Morison)

為害葉片、花、種球及貯存之種球，唐菖蒲最嚴重，其次為鳶尾、百合、水仙、小蒼蘭、康乃馨等。

6. 腹鉤薊馬 *Rhipiphorothrips cruentatus* Hood

為害玫瑰、欖仁樹葉片。

7. 榕樹薊馬 *Gynaikothrips uzeli* Zimmerman

為害榕樹嫩葉，使葉片捲縮，有褐色斑點，薊馬藏於其內。

薊馬類昆蟲，一般體形細小狹長，除了榕樹薊馬以外，大多數要用放大鏡才能看清它的輪廓，卵多數都產在植物較幼嫩部分的組織內，並露出一部分在外，有些產在較隱密處。成蟲與若蟲習性相似，銼吸植物花瓣、花蕾、葉片、幼果及種球等，食痕成一個

