主要虫害

1.**莖潛蠅**：幼虫孵化後潛入嫩莖部，嚴重時危害莖之髓部，阻礙水分上升，造成幼株生育不良，甚至枯萎。防治方法：播種時，使用 5%二硫松粒劑與適量砂土混拌，均勻撒佈，每穴0.5公克、或10%福瑞松粒劑每穴0.25克。

2.**蚜虫**：棲息於嫩葉或嫩心，危害部位心葉向內捲曲，阻礙植株發育，又是傳播毒素病之工具。防治方法：參考使用 2.8%第滅寧乳劑1000倍、或2.8%賽洛寧乳劑1000倍、或 2.8%畢芬寧乳劑1000倍防治。

3.**薊馬**：危害花蕊、花器，嚴重時花器變黑，造成花器發育不全、落花，不能結莢；如幼莢期危害，會有疤痕留在莢上，影響商品價值。防治方法：請參考使用2.8%畢芬寧乳劑1000倍、或2.8%賽洛寧乳1000倍防治。

4.**葉蟎(紅蜘蛛)**：成蟎及幼蟎棲於葉背危害使葉背向下彎曲，但老葉較多密度高時，葉片變黃脫落，高溫乾燥季節，危害較嚴重。防治方法：請參考使用上述薊馬防治藥劑。

5.**潛葉蠅**：幼虫喜食葉肉，以致葉片表面呈隧道狀，影響光合作用，秋冬季較易發生。防治方法：請參考使用汽嘉讚藥劑。

栽培注意事項


㈠注意田間衛生，早期若發現毒素病株，立即拔除銷燬，以免毒素病之蔓延。

㈡種植前，種子需用藥劑處理消毒，預防經由種子傳播之病害發生。

㈢避免種植豇豆之菜園避免連作，最好以水稻輪作，避免土生菌，防止土壤傳染病虫害之發生，如萎凋病等。

㈣目前防治豇豆藥劑不多，應慎選〝蔬菜可用〞低毒性殘效性短之藥劑，尤其須先噴施幾株觀察，証實無藥害後，再行全區防治。

㈤豇豆是連續性採收的作物，在採收期間只能使用低毒性或殘毒短的藥劑。特別注意〝農藥安全採收期〞，避免農藥殘毒，確保消費者之健康。



莖潛蠅危害狀



蚜虫危害



薊馬危害花蕊變黑