

黃秋葵花朵

旱時期，每週滴灌二次，以助長植株生育。若沒有覆蓋塑膠布，可於作畦後定植前3天，以45%拉草乳劑500倍，全面噴施畦面及畦溝，否則，就應該進行中耕培土，以減少雜草生長及增加土壤通氣性。種植後，植株生育期間，以20%嘉磷塞溶液 100倍直接噴在雜草上，但切記，一定不可噴及植株莖葉，以免造成損傷。植株長到 1公尺左右，若無防風設施處理，宜立支柱，並加縛繫，以防風襲而倒伏。

長至7～8片本葉時，在腋間開出美麗的黃色花朵，4～6天後，即可採其嫩果作生鮮蔬菜。其嫩果含有粘滑汁液及富含維他命B，日本人認爲具有强健身體之功效，澎湖本地人則視爲胃疾之食療聖品，調理方法很多(下集介紹)。除了味覺享受外，果實的特殊造型，亦可作插花的花材，晒乾的果莢可作成乾燥花，或塗上金、銀色彩，作彩飾。

黃秋葵生育期間甚少有病蟲害發生，除幼苗期應注意水分管理，以避免疫病發生外，生育期間，因節氣的關係，6月中旬左右斜紋夜盜虫發生嚴重，平時會有蚜蟲爲害，可參考農林廳推薦蔬菜防治藥劑，以50%馬拉松乳劑噴撒，若恰逢結果期，需於採收前 4天停止用藥。 9月後，已是生育後期，東北季風開始來臨，未加防風設施保護之植株，葉片易受鹽害，而發生葉枯病，但不會影響產量；10月後，田間作物多已採收，防風牆下之黃秋葵雖可生長，但產量低，易成疾病、害蟲之棲息地，宜剷除植株，可減少次年田間病蟲害之發生。

澎湖可種植品種有 3種，其中以〝清福〞每株產量1800公克最高，〝五福〞1720公克次之，〝南洋〞1650公克最低，但品種間的差異並不顯著。在澎湖炎炎夏季裡，諸多蔬菜因溫度過高，病蟲害發生嚴重，而栽培不易，黃秋葵不失爲良好的夏日蔬菜。若能進一步改進栽培技術，研發各種食譜及用途，並廣爲推廣宣傳，不但可以打開消費市場，且可外銷國外，作爲高價值蔬菜。（下期介紹黃秋葵食用法）



黃秋葵果實