

淡白色。土壤水份會影響植物對氯氣之敏感度，土壤濕度低時較土壤濕度高時敏感。

(四)固態污染物：常於植物表面形成硬塊。大量的灰塵沈積於植物體上，會造成植物生長之抑制，或覆蓋於生長點上而影響了新芽的生長，或影響柱頭花粉之發芽及減少果實之數目。

瞭解農作物被空氣污染徵狀之後，有助於農業公害現場勘估與糾紛處理，當農業公害陳情案件提出後，由環保單位邀集農政機關、農業試驗場、所、鄉鎮公所、陳情人（受害人）及被陳情人（污染源）等會同實地勘查，採樣鑑定

及損失程度查估，做成會勘紀錄，然後邀集雙方協商補償有關事宜，若雙方協商無法達成和解，可再陳情上級主管機關辦理複勘及第二次協調，如雙方無法獲得最終協議時，可採取司法訴訟途徑解決。

總之，現今空氣品質日益惡劣，農業公害之發生時有所聞，直接或間接危害到農業生產及農民收益。因此，除了嚴格監督輔導，改善杜絕污染源外，提供一些具有耐毒性或抵抗性之作物，或淨化污染空氣能力強之作物，以供栽培，將是今後努力之方向。



穀粒呈黑褐色。
水稻受氟化物為害，稻粒中空，

氟化物污染芒果，新葉捲縮乾枯



枯萎葉尖變黃。
唐菖蒲受二氧化硫為害，葉片褐化



種植指標植物，監測空氣污染徵狀

